NITROMAG

ZAKRES STOSOWANIA:

— JABŁOŃ – OWOCUJĄCY SAD – sady bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ zielony pąk	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ różowy pąk	
◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła	
◆ początek rozwoju owoców	
◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości	
◇ po zbiorze owoców	

— JABŁOŃ – OWOCUJĄCY SAD – sady fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ zielony pąk	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◇ po zbiorze owoców	

— JABŁOŃ – MŁODY NIEOWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych	

— JABŁOŃ – SZKÓŁKI DRZEWEK SZCZEPIONYCH PRZEZ OKULIZACJĘ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się podkładek): początek rozwoju liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści	
◆ 2. rok – wiosna (po ścięciu podkładki nad tarczką okulizacyjną): początek rozwoju pędu i liści	
◆ 2. rok – wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych	

— JABŁOŃ – SZKÓŁKI DRZEWEK SZCZEPIONYCH ZRAZAMI

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się zaszczepionych podkładek): początek rozwoju pędów i liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści	
◆ 2. rok – wiosna (10–14 dni po ścięciu pędu głównego na wysokość 60–65 cm): początek rozwoju pędów i liści	
◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych	

— GRUSZA – OWOCUJĄCY SAD – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ zielony pąk	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ biały pąk	
◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła	
◆ początek rozwoju owoców	
◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości	
◇/◆ po zbiorze owoców Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.	

— GRUSZA – OWOCUJĄCY SAD – sady fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ zielony pąk	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◇/◆ po zbiorze owoców Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.	

— CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ rozwój zawiązków owoców	
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ po zbiorach owoców: 2–3 zabiegi co 10–14 dni	

CZEREŚNIA – sady fertygowane – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po zbiorach owoców: 2–3 zabiegi co 10–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha

WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ rozwój zawiązków owoców	
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ po zbiorach owoców: 2–3 zabiegi co 10–14 dni	

BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ rozwój zawiązków owoców	
◇ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości	
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	

NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ rozwój zawiązków owoców	
◇ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości	
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	

KABACZEK – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	
◇ po pierwszym zbiorze	

OGÓREK – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	

WINOROŚL

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ początek rozwoju liści i nowych pędów	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ rozwój kwiatostanów	
◆ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	

AGREST

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – pękanie pąków	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ rozwój liści – do początku rozwoju kwiatostanów	
◆ bezpośrednio po zbiorze	

ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ rozwój zawiązków owoców	
◇ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości	
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	

— CUKINIA – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	
◇ po pierwszym zbiorze	

— MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇/◆pękanie i rozwój pąków kwiatowych Zabieg należy traktować jako optymalny gdy temperatura powietrza pozwala na efektywne jego przeprowadzenie.	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ rozwój zawiązków owoców	
◇ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości	
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	

— PORZECZKA – plantacje bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów	
◇ początek rozwoju owoców	
◆ bezpośrednio po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny	

— PORZECZKA – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆/◇ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 10–14 dni. Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku braku możliwości stosowania fertygacji.	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach: 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny	

— BORÓWKA AMERYKAŃSKA – plantacja niefertygowana – plantacje owocujące

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ początkowy rozwój liści i kwiatostanów	
◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia	
◇ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców	
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni	

— TRUSKAWKA – plantacje bez ferygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: rozwój liści i koron	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon	

— TRUSKAWKA – plantacje bez ferygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ biały pąk	
◆ początek kwitnienia	
◇ początek rozwoju pierwszych owoców	
◆ po zbiorach owoców, 1–2 zabiegi co 10–21 dni W przypadku koszenia liści, zabieg wykonać w fazie 2–3 rozwiniętych, nowych liści.	

— TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów	
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach	
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek	

— TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów	
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach	
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 2.–3. dzień po sadzonkowaniu	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%
◆ SADZONKI DONICZKOWANE: 5.–7. dzień po sadzonkowaniu	
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 14.–21. dzień po sadzonkowaniu	

— TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów	
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach	
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek	

— MALINA OWOCUJĄCA NA PĘDACH JEDNOROCZNYCH

Plantecje bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści i pędów: 2–3 zabiegi co 14–21 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◇ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów	
◇ początek rozwoju pierwszych owoców	

Plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇/◆ rozwój liści i pędów: 2–3 zabiegi co 14–21 dni Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku braku możliwości stosowania fertygacji.	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha

— MALINA OWOCUJĄCA NA PĘDACH DWULETNICH

Plantecje bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści i pędów: 2 zabiegi co 10–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów	
◇ początek rozwoju owoców	
◆ bezpośrednio po zbiorach: 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny	

Plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇/◆ rozwój liści i pędów: 2 zabiegi co 10–14 dni Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku braku możliwości stosowania fertygacji.	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach: 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny	

— POMIDOR GRUNTOWY DO PRZETWÓRSTWA (PRZEMYSŁOWY) – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin	
◆ początek rozwoju kwiatostanów	
◆ początek kwitnienia	
◇ rozwój owoców	

— POMIDOR NA ŚWIEŻY RYNEK – uprawa w glebie lub substratach organicznych – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◇ intensywny wzrost roślin	

WARZYWA DYNIOWATE – produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%.

WARZYWA PSIANKOWATE - produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%

PAPRYKA – uprawa w glebie lub substratach organicznych – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◇ intensywny wzrost roślin	
◇ rozwój pierwszych pąków kwiatowych	

PAPRYKA - uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin	
◆ rozwój pierwszych pąków kwiatowych	
◆ początek kwitnienia	
◇ początek rozwoju owoców	

OGÓREK – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	

CUKINIA – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	
◇ po pierwszym zbiorze	

KABACZEK – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	
◇ po pierwszym zbiorze	

DYNIA – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 10–21 dni	
◇ początek rozwoju owoców	
◇ wzrost owoców	

MELON – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 10–21 dni	
◇ początek rozwoju owoców	
◇ wzrost owoców	

— ARBUZ – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 10–21 dni	
◇ początek rozwoju owoców	
◇ wzrost owoców	

— CEBULA – uprawa z siewu, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–5. liścia	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki cebuli	
◇ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości	

— CEBULA – uprawa z rozsady, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści: 2 zabiegi co 7–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ początek formowania się główki cebuli	
◇ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości	

— CEBULA – uprawa z dymki, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–5. liścia	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki cebuli	
◇ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości	

— CEBULA – produkcja dymki

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści – do początku formowania się główki cebuli	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha

— CZOSNEK uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–5. liścia	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki czosnku	
◇ główka czosnku osiąga 30–50% typowej wielkości	

— POR – uprawa z rozsady, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ początkowy wzrost roślin: 3 zabiegi co 7–14	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◇ część przeznaczona do zbioru osiąga 30–50% typowej wielkości	

— WARZYWA CEBULOWE – produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%

— BROKUŁ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ wzrost liści: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	
◇ początek rozwoju róży	

KALAFIOR

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha
◆ wzrost liści: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	
◇ początek rozwoju róży	

KALAREPA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha

RZODKIEWKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po wschodach roślin – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–3 L/ha

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki: 2 zabiegi co 14–21 dni	
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	

KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki: 2 zabiegi co 14–21 dni	
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	

— KAPUSTA WŁOSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki: 2 zabiegi co 14–21 dni	
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	

— KAPUSTA PEKIŃSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost liści	
◇ początek formowania się główki: 2 zabiegi co 14–21 dni	

— KAPUSTA BRUKSELSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost pędu głównego i liści	
◆ początek formowania się pąków bocznych (główek liściowych)	
◇ ok. 50% główek uformowanych	

— JARMUŻ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost pędu głównego i liści	
◇ utworzone ok. 50% masy liściowej	

— WARZYWA KAPUSTNE – produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pierwszych liści właściwych: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%

— MARCHEW

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42)	
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)	

— PIETRUSZKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42)	
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)	

— PASTERNAK

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42)	
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)	

— SZKÓŁKI DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ od początku każdego sezonu wegetacyjnego: 2–3 zabiegi co 21–28 dni	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%

— BURAK ĆWIKŁOWY

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31)	
◇ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43)	

— SELER

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
Rozsada ◇ faza 2.–3. liścia właściwego (BBCH 12–13)	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%
Uprawa w gruncie ◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18) ◆ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 19/41–42) ◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha

— PRODUKCJA ROZSADY ROŚLIN OZDOBNYCH

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ od początku każdego sezonu wegetacyjnego: 2–3 zabiegi co 21–28 dni	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%

— PRODUKCJA ROZSADY ROŚLIN OZDOBNYCH

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści: 1–2 zabiegi co 7–21	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%

— PRODUKCJA ROŚLIN OZDOBNYCH DONICZKOWYCH

Terminy stosownaia (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści: 2–3 zabiegi co 7–21 dni	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%

— TRAWNIKI, POLA GOLFOWE

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ w okresie wegetacji: 2–5(8) zabiegi co 21–28 dni	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%

— ROŚLINY OZDOBNE ZIELNE (jednoroczne, dwuletnie oraz byliny)

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści: po wschodach roślin uprawianych z siewu / po przyjęciu się sadzonek gatunków uprawianych z rozsady / po wznowieniu wegetacji wiosennej roślin dwuletnich i bylin	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 14–28 dni	