KALPRIM

ZAKRES STOSOWANIA:

JABŁOŃ – OWOCUJĄCY SAD – sady bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ zielony pąk	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ różowy pąk	
◇ koniec kwitnienia: większość płatków opadła	
◇/◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian nie przeznaczonych do długotrwałego przechowywania.	
◆ owoc osiąga 60–80% typowej wielkości	
◇/◆ po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze owoców.	

JABŁOŃ – OWOCUJĄCY SAD – sady fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ zielony pąk	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇/◆ po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze owoców.	

JABŁOŃ – MŁODY NIEOWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ Wiosna: rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych	
◆ Późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego	

— JABŁOŃ – SZKÓŁKI DRZEWEK SZCZEPIONYCH PRZEZ OKULIZACJĘ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ 2. rok – wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych	
◆ 2. rok – późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego	

— JABŁOŃ – SZKÓŁKI DRZEWEK SZCZEPIONYCH ZRAZAMI

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych	
◆ 2. rok – późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego	

— GRUSZA – OWOCUJĄCY SAD – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ zielony pąk	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ biały pąk	
◇ koniec kwitnienia: większość płatków opadła	
◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości	
◆ owoc osiąga 60–80% typowej wielkości	
◆ początek dojrzewania owoców	
◇/◆ po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze owoców.	

— GRUSZA – OWOCUJĄCY SAD – sady fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ zielony pąk	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇/◆ po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze owoców.	

— CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ rozwój zawiązków owoców	
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ początek dojrzewania owoców	
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni	
◇/◆ przed początkiem przebarwiania się liści Zabieg traktować jako optymalny w przypadku przedłużonego wzrostu pędów.	

— CZEREŚNIA – sady fertygowane – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇/◆ przed początkiem przebarwiania się liści Zabieg traktować jako optymalny w przypadku przedłużonego wzrostu pędów.	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha

— WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ rozwój zawiązków owoców	
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ początek dojrzewania owoców	
◆ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni	
◇/◆ przed początkiem przebarwiania się liści Zabieg traktować jako optymalny w przypadku przedłużonego wzrostu pędów.	

ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ rozwój zawiązków owoców	
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ początek dojrzewania owoców	
◆ po zbiorach owoców	
◇/◆ przed początkiem przebarwiania się liści Zabieg traktować jako optymalny w przypadku przedłużonego wzrostu pędów.	

BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ rozwój zawiązków owoców	
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ początek dojrzewania owoców	
◆ po zbiorach owoców	
◇/◆ przed początkiem przebarwiania się liści Zabieg traktować jako optymalny w przypadku przedłużonego wzrostu pędów.	

NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ rozwój zawiązków owoców	
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ początek dojrzewania owoców	
◆ po zbiorach owoców	
◇/◆ przed początkiem przebarwiania się liści Zabieg traktować jako optymalny w przypadku przedłużonego wzrostu pędów.	

MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇/◆ pękanie i rozwój pąków kwiatowych Zabieg należy traktować jako optymalny gdy temperatura powietrza pozwala na efektywne jego przeprowadzenie.	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ rozwój zawiązków owoców	
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ początek dojrzewania owoców	
◆ po zbiorach owoców	
◇/◆ przed początkiem przebarwiania się liści Zabieg traktować jako optymalny w przypadku przedłużonego wzrostu pędów.	

AGREST

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost owoców – do początku dojrzewania: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ po zbiorze owoców	

MALINA OWOCUJĄCA NA PĘDACH JEDNOROCZNYCH

Plantacje bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 21–28 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów	
◆ początek rozwoju pierwszych owoców	
◆ po kolejnych zbiorach: 3–4 zabiegi co 5–14 dni	
◆ po zbiorach	

Plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇/◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 21–28 dni Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku braku możliwości stosowania fertygacji.	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ po zbiorach	

— MALINA OWOCUJĄCA NA PĘDACH DWULETNICH

Plantacje bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów	
◆ początek rozwoju owoców	
◆ po kolejnych zbiorach: 3–4 zabiegi co 5–7 dni	
◆ bezpośrednio po zbiorach: 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny	

Plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇/◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 10–14 dni Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku braku możliwości stosowania fertygacji.	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach: 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny	

— PORZECZKA - plantacje bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów	
◆ początek rozwoju owoców	
◆ wzrost owoców: 2 zabiegi co 5–14 dni	
◆ bezpośrednio po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny	

— PORZECZKA - plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆/◇ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 10–14 dni Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku braku możliwości stosowania fertygacji	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ bezpośrednio po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny	

— BORÓWKA AMERYKAŃSKA – plantacja bez fertygacji – plantacje owocujące

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój pąków	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ początkowy rozwój liści i kwiatostanów	
◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia	
◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców	
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 2 zabiegi co 10–14 dni	
◆ po zbiorach owoców	
◆ początek przebarwiania się liści	

— BORÓWKA AMERYKAŃSKA – plantacje fertygowane – plantacje owocujące

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ początek przebarwiania się liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha

— WINOROŚL

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój kwiatostanów	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ koniec kwitnienia	
◆ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu	
◇/◆ początek dojrzewania owoców Zabieg traktować jako optymalny dla winogron przeznaczonych na wino i dla deserowych odmian czerwono owocowych.	

— TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Jesień w roku sadzenia: przed spoczynkiem zimowym	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon	
◆ Jesień w pierwszym roku po posadzeniu: przed początkiem przebarwiania się liści	

— TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ początek rozwoju kwiatostanów	
◆ biały pąk	
◆ początek rozwoju pierwszych owoców	
◆ początek dojrzewania pierwszych owoców	
◆ bezpośrednio po pierwszym zbiorze	
◆ Jesień: przed początkiem przebarwiania się liści	

— TRUSKAWKA – plantacje fertygowane – Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ rozwój i dojrzewanie owoców	
◆ Jesień w pierwszym roku po posadzeniu: przed początkiem przebarwiania się liści	

— TRUSKAWKA – plantacje fertygowane – Odmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – Uprawa w gruncie

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój i dojrzewanie owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ przed początkiem przebarwiania się liści	

— TRUSKAWKA – plantacje fertygowane – Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach.

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój i dojrzewanie pierwszych owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ okres owocowania: 2–4 zabiegi co 10–21 dni	

— TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach	
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek	

— TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach	

— TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach	
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek	
◆ Początek jesieni: rozłogi z ukorzenionymi sadzonkami zakrywają międzyrzędzia *(jeżeli jest techniczna możliwość wykonania zabiegu)*	

— POMIDOR GRUNTOWY DO PRZETWÓRSTWA (PRZEMYSŁOWY) – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ intensywny wzrost roślin	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ rozwój kwiatostanów – początek kwitnienia: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	
◆ rozwój owoców: 2 zabiegi co 7–21 dni	
◆ dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 7–21 dni	

— POMIDOR GRUNTOWY DLA PRZETWÓRSTWA (PRZEMYSŁOWY) – uprawa w polu – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ intensywny wzrost roślin	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ rozwój kwiatostanów – początek kwitnienia: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	
◆ rozwój owoców: 2 zabiegi co 7–21 dni	
◆ dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 7–21 dni	

— POMIDOR NA ŚWIEŻY RYNEK – uprawa w glebie lub substratach organicznych – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ intensywny wzrost roślin	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ rozwój kwiatostanów – początek kwitnienia: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	
◆ rozwój owoców: 2 zabiegi co 7–21 dni	
◆ dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 7–21 dni	

— PAPRYKA – uprawa bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ intensywny wzrost roślin	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ rozwój kwiatostanów – początek kwitnienia: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	
◆ początek rozwoju owoców: 2 zabiegi co 7–21 dni	
◆ po kolejnych zbiorach: 1–2 zabiegi co 7–21 dni	

— PAPRYKA – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ intensywny wzrost roślin	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ rozwój pierwszych pąków kwiatowych – początek kwitnienia: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	
◆ początek rozwoju owoców: 1-2 zabiegi co 7–21 dni	
◆ po kolejnych zbiorach: 1–2 zabiegi co 7–21 dni	

— WARZYWA PSIANKOWATE – produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	Podlewanie roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie roztwór 0,25–0,3%

— OGÓREK – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek kwitnienia	
◆ po pierwszym zbiorze	
◆ po kolejnych zbiorach: 1–3 zabiegi co 7–14 dni	

— OGÓREK – uprawa w polu lub pod osłonami (w glebie lub substratach organicznych) – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ początek kwitnienia	
◇po pierwszym zbiorze	
◇ po kolejnych zbiorach: 1–3 zabiegi co 7–14 dni	

— CUKINIA – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek kwitnienia	
◆ po pierwszym zbiorze	
◆ po kolejnych zbiorach: 1–3 zabiegi co 14–21 dni	

— CUKINIA – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ początek kwitnienia	
◇ po pierwszym zbiorze	
◇ po kolejnych zbiorach: 1–3 zabiegi co 14–21 dni	

— KABACZEK – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek kwitnienia	
◆ po pierwszym zbiorze	
◆ po kolejnych zbiorach: 1–3 zabiegi co 14–21 dni	

— KABACZEK – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ początek kwitnienia	
◇ po pierwszym zbiorze	
◇ po kolejnych zbiorach: 1–3 zabiegi co 14–21 dni	

— DYNIA – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju owoców	
◆ wzrost owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni	

DYNIA – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ początek kwitnienia	
◇ początek rozwoju owoców	
◇ wzrost owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni	

MELON – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju owoców	
◆ wzrost owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni	

MELON – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ początek kwitnienia	
◇ początek rozwoju owoców	
◇ wzrost owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni	

ARBUZ – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju owoców	
◆ wzrost owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni	

ARBUZ – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ początek kwitnienia	
◇ początek rozwoju owoców	
◇ wzrost owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni	

WARZYWA DYNIOWATE – produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści	Podlewanie roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie roztwór 0,25–0,3%

CEBULA – uprawa z siewu, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ faza 3.–5. liścia	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki cebuli	
◆ wzrost główki cebuli – do początku załamywania się szczypioru: 2–3 zabiegi co 5–21 dni	

CEBULA – uprawa z rozsady, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści: 2 zabiegi co 7–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek formowania się główki cebuli	
◆ wzrost główki cebuli – do początku załamywania się szczypioru: 2–3 zabiegi co 5–21 dni	

CEBULA – uprawa z dymki, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ faza 3.–5. liścia	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki cebuli	
◆ wzrost główki cebuli – do początku załamywania się szczypioru: 2–3 zabiegi co 5–21 dni	

CEBULA – produkcja dymki

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści – do początku formowania się główki cebuli	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ wzrost główki cebuli – do początku załamywania się szczypioru	

CZOSNEK uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ faza 3.–5. liścia	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki czosnku	
◆ wzrost główki czosnku: 2–3 zabiegi co 5–21 dni	

POR – uprawa z rozsady, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ początkowy wzrost roślin: 1–3 zabiegi co 7–14	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ wzrost części przeznaczonej do zbioru: 2–3 zabiegi co 5–21 dni	

WARZYWA CEBULOWE - produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści: 1–2 zabiegi co 7–21 dni	Podlewanie roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie roztwór 0,25–0,3%

BROKUŁ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek rozwoju róży	
◆ wzrost róży: 2 zabiegi co 7–10 dni	

KALAFIOR

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek rozwoju róży	
◆ wzrost róży: 2 zabiegi co 7–10 dni	

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek formowania się główki	
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości: 2 zabiegi co 7–14 dni	

KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek formowania się główki	
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości: 2 zabiegi co 7–14 dni	

KAPUSTA WŁOSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek formowania się główki	
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości: 2 zabiegi co 7–14 dni	

KAPUSTA PEKIŃSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek formowania się główki	
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości	

KAPUSTA BRUKSELSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost pędu głównego i liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek formowania się pąków bocznych (główek liściowych)	
◆ 70–80% główek uformowanych	

KALAREPA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek tworzenia zgrubienia	

RZODKIEWKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek tworzenia zgrubienia	

— JARMUŻ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost pędu głównego i liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ intensywny wzrost masy liściowej	
◆ utworzone ok. 70–80% masy liściowej	

— WARZYWA KAPUSTNE – produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści: 1–2 zabiegi co 7–21 dni	Podlewanie roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie roztwór 0,25–0,3%

— MARCHEW

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42)	
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)	
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47)	
◆ korzeń osiąga ok. 80% typowej średnicy (BBCH 48)	

— PIETRUSZKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42)	
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)	
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47)	
◆ korzeń osiąga ok. 80% typowej średnicy (BBCH 48)	

PASTERNAK

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42)	
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)	
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47)	
◆ korzeń osiąga ok. 80% typowej średnicy (BBCH 48)	

SELER

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 19/41)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42)	
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 42–44)	
◆ korzeń osiąga 50–60% typowej średnicy (BBCH 45–46)	
◆ korzeń osiąga 70–80% typowej średnicy (BBCH 47–48)	

BURAK ĆWIKŁOWY

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31)	
◆ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43)	
◆ korzeń osiąga 40–70% typowej średnicy (BBCH 44–47)	

SZKÓŁKI DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego: 1–2 zabiegi co 14–21 dni	Podlewanie roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie roztwór 0,25–0,3%

— PRODUKCJA ROZSADY ROŚLIN OZDOBNYCH

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ tuż przed początkiem kwitnienia: 1–2 zabiegi co 5–10 dni	Podlewanie roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie roztwór 0,25–0,3%

— PRODUKCJA ROŚLIN OZDOBNYCH DONICZKOWYCH

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści: 1–2 zabiegi co 7–21 dni	Podlewanie roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie roztwór 0,25–0,3%

— SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH JEDNOROCZNYCH

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści: 1–2 zabiegi co 7–21 dni	Podlewanie roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie roztwór 0,25–0,3%

— TRAWNIKI, POLA GOLFOWE

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ w okresie wegetacji: 2–5(8) zabiegi co 21–28 dni	Podlewanie roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie roztwór 0,25–0,3%

— ROŚLINY OZDOBNE ZIELNE (jednoroczne, dwuletnie i byliny)

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ przed kwitnieniem	Podlewanie roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie roztwór 0,25–0,3%
◆ w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego: 1–2 zabiegi co 14–21 dni	

— DRZEWA I KRZEWY OZDOBNE

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ przed kwitnieniem (gatunki kwitnące)	Podlewanie roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie roztwór 0,25–0,3%
◆ w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego: 1–2 zabiegi co 14–21 dni	