OPTYSIL

ZAKRES STOSOWANIA:

JABŁOŃ – OWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ zielony pąk	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ różowy pąk	
◇ koniec kwitnienia: większość płatków opadła	
◆ początek rozwoju owoców	
◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości	

JABŁOŃ – MŁODY NIEOWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych	
◆ Późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego	

JABŁOŃ – SZKÓŁKI DRZEWEK SZCZEPIONYCH PRZEZ OKULIZACJĘ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się podkładek): początek rozwoju liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści	
◆ 2. rok – wiosna (po ścięciu podkładki nad tarczką okulizacyjną): początek rozwoju pędu i liści	
◆ 2. rok – wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych	
◆ 2. rok – późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego	

— JABŁOŃ – SZKÓŁKI DRZEWEK SZCZEPIONYCH ZRAZAMI

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się zaszczepionych podkładek): początek rozwoju pędów i liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści	
◆ 2. rok – wiosna (10–14 dni po ścięciu pędu głównego na wysokość 60–65 cm): początek rozwoju pędów i liści	
◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych	
◆ 2. rok – późne lato: zakończenie wzrostu wydłużeniowego pędu głównego	

— GRUSZA – OWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ zielony pąk	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ biały pąk	
◇ koniec kwitnienia: większość płatków opadła	
◆ początek rozwoju owoców	
◆ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości	

— CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych: 1–2 zabiegi co 5–7 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ rozwój zawiązków owoców	
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ początek dojrzewania owoców	

— CZEREŚNIA – sady fertygowane – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych: 1–2 zabiegi co 5–7 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ rozwój zawiązków owoców	
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ początek dojrzewania owoców	

— WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych: 1–2 zabiegi co 5–7 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ rozwój zawiązków owoców	
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ początek dojrzewania owoców	

— ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych: 1–2 zabiegi co 5–7 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ rozwój zawiązków owoców	
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ początek dojrzewania owoców	

— BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych: 1–2 zabiegi co 5–7 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ rozwój zawiązków owoców	
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ początek dojrzewania owoców	

NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych: 1–2 zabiegi co 5–7 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ rozwój zawiązków owoców	
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ początek dojrzewania owoców	

MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆/◇ pękanie i rozwój pąków kwiatowych Zabieg należy traktować jako optymalny gdy temperatura powietrza pozwala na efektywne jego przeprowadzenie.	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ rozwój zawiązków owoców	
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ początek dojrzewania owoców	

AGREST

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści – do początku rozwoju kwiatostanów	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ początek rozwoju owoców	
◆ wzrost owoców	
◇ bezpośrednio po zbiorze	

MALINA OWOCUJĄCA NA PĘDACH JEDNOROCZNYCH

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 21–28 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów	
◇ początek rozwoju pierwszych owoców	
◆ rozwój owoców – do pierwszego zbioru	

MALINA OWOCUJĄCA NA PĘDACH DWULETNICH

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój liści i pędów	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów	
◇ początek rozwoju owoców	
◆ rozwój owoców – do pierwszego zbioru	
◇ bezpośrednio po zbiorach	

PORZECZKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ rozwój liści – do początku rozwoju kwiatostanów	
◇ bezpośrednio po zbiorze	

BORÓWKA AMERYKAŃSKA – plantacje bez fertygacji – plantacje owocujące

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia	
◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców	
◇ po zbiorach owoców	

BORÓWKA AMERYKAŃSKA – plantacje fertygowane – plantacje owocujące

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia	
◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców	
◇ po zbiorach owoców	

— WINOROŚL

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ początek rozwoju liści i nowych pędów	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ rozwój kwiatostanów	
◆ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu	
◆ jagody zaczynają stykać się ze sobą	
◆ początek dojrzewania owoców	

— TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią.

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: rozwój liści i koron	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon	

— TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące.

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ biały pąk	
◇ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju pierwszych owoców	
◆ bezpośrednio po pierwszym zbiorze	

— TRUSKAWKA – plantacje fertygowane – Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie.

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Późne lato w roku sadzenia: dalszy rozwój liści i zawiązywanie pąków na przyszły sezon	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ Wiosna: po wznowieniu wegetacji	
◆ początek rozwoju kwiatostanów	
◇ początek rozwoju pierwszych owoców	
◆ rozwój i dojrzewanie owoców	

TRUSKAWKA – plantacje fertygowane – Odmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – Uprawa w gruncie.

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści i kwiatostanów: 2 zabiegi co 5–10 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ początek rozwoju pierwszych owoców	
◆ rozwój i dojrzewanie owoców	

TRUSKAWKA – plantacje fertygowane – Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach.

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści: 2 zabiegi co 7–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ początek rozwoju pierwszych owoców	
◆ rozwój i dojrzewanie pierwszych owoców	
◆ okres owocowania: 2–4 zabiegi co 14–21 dni	

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu rozłogów	
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach	
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek	

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów	
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach	
◆ SADZONKI DONICZKOWE: 14.-21. dzień po sadzonkowaniu	Podlewanie lub opryskiwanie: roztwór 0,01 %

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu rozłogów	
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach	
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek	

POMIDOR GRUNTOWY DO PRZETWÓRSTWA (PRZEMYSŁOWY)

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ intensywny wzrost roślin	**Zabiegi dolistne** – jednorazowa dawka 0,5 L/ha LUB **Fertygacja** – jednorazowa dawka 0,5 L/ha: uprawy gruntowe co 2 tygodnie, uprawy bezglebowe –zalewanie mat oraz kilkakrotnie w okresie wegetacji roślin
◇ początek rozwoju kwiatostanów	
◇ początek kwitnienia	
◆ rozwój owoców: 1–2 zabiegi co 7–21 dni	

POMIDOR NA ŚWIEŻY RYNEK

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ intensywny wzrost roślin	**Zabiegi dolistne** – jednorazowa dawka 0,5 L/ha LUB **Fertygacja** – jednorazowa dawka 0,5 L/ha: uprawy gruntowe co 2 tygodnie, uprawy bezglebowe –zalewanie mat oraz kilkakrotnie w okresie wegetacji roślin
◇ rozwój pierwszych kwiatostanów	
◇ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju owoców: 1–2 zabiegi co 7–21 dni	
◇ po kolejnych zbiorach	

WARZYWA PSIANKOWATE - produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 1.-3. liść właściwy	Podlewanie lub opryskiwanie – roztwór 0,05–0,1%

— PAPRYKA

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ intensywny wzrost roślin	**Zabiegi dolistne** – jednorazowa dawka 0,5 L/ha LUB **Fertygacja** – jednorazowa dawka 0,5 L/ha: uprawy gruntowe co 2 tygodnie, uprawy bezglebowe –zalewanie mat oraz kilkakrotnie w okresie wegetacji roślin
◇ rozwój pierwszych kwiatostanów	
◇ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju owoców: 1–2 zabiegi co 7–21 dni	
◇ po kolejnych zbiorach	

— OGÓREK – uprawa w polu lub pod osłonami

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	
◇ początek kwitnienia	
◆ po pierwszym zbiorze	

— CUKINIA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	
◇ początek kwitnienia	
◆ po pierwszym zbiorze	

— KABACZEK

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	
◇ początek kwitnienia	
◆ po pierwszym zbiorze	

DYNIA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	
◇ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju owoców	

MELON

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	
◇ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju owoców	

ARBUZ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	
◇ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju owoców	

WARZYWA DYNIOWATE – produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści	Podlewanie lub opryskiwanie – roztwór 0,05–0,1%

CEBULA – uprawa z siewu, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ faza 3.–5. liścia	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki cebuli	
◆ główka cebuli osiąga 60–80% typowej wielkości – do początku załamywania się szczypioru	

CEBULA – uprawa z rozsady, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ początek formowania się główki cebuli	
◆ główka cebuli osiąga 60–80% typowej wielkości – do początku załamywania się szczypioru	

CEBULA – uprawa z dymki, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ faza 3.–5. liścia	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki cebuli	
◆ główka cebuli osiąga 60–80% typowej wielkości – do początku załamywania się szczypioru	

CEBULA – produkcja dymki

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost główki cebuli – do początku załamywania się szczypioru	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha

CZOSNEK uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ faza 3.–5. liścia	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki czosnku	
◆ główka czosnku osiąga 60–80% typowej wielkości – do początku żółknięcia liści	

POR – uprawa z rozsady, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ początkowy wzrost roślin: 2–3 zabiegi co 7–14	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ część przeznaczona do zbioru osiąga 60–80% typowej wielkości	

WARZYWA CEBULOWE - produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści	Podlewanie lub opryskiwanie – roztwór 0,05–0,1%

BROKUŁ

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady	**Zabiegi dolistne** – jednorazowa dawka 0,5 L/ha LUB **Fertygacja** – jednorazowa dawka 0,5 L/ha: uprawy gruntowe – co 2 tygodnie
◆ wzrost liści	
◆ początek rozwoju róży	

KALAFIOR

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady	**Zabiegi dolistne** – jednorazowa dawka 0,5 L/ha LUB **Fertygacja** – jednorazowa dawka 0,5 L/ha: uprawy gruntowe – co 2 tygodnie
◆ wzrost liści	
◆ początek rozwoju róży	

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki	
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	

KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki	
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	

KAPUSTA WŁOSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki	
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	

KAPUSTA PEKIŃSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki	

KAPUSTA BRUKSELSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ wzrost pędu głównego i liści	
◆ początek formowania się pąków bocznych (główek liściowych)	
◇ ok. 50% główek uformowanych	

KALAREPA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ początek tworzenia zgrubienia	

RZODKIEWKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po wschodach roślin – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ początek tworzenia zgrubienia	

JARMUŻ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ wzrost pędu głównego i liści	
◆ intensywny wzrost masy liściowej	

WARZYWA KAPUSTNE – produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści	Podlewanie lub opryskiwanie – roztwór 0,1%

MARCHEW

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42)	
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)	
◆ korzeń osiąga 70–80% typowej średnicy (BBCH 47–48)	

PIETRUSZKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42)	
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)	
◆ korzeń osiąga 70–80% typowej średnicy (BBCH 47–48)	

PASTERNAK

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42)	
◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)	
◆ korzeń osiąga 70–80% typowej średnicy (BBCH 47–48)	

SELER

Terminy stosownaia (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
Rozsada: ◆ faza 2.–3. liścia właściwego (BBCH 12–13)	Podlewanie lub opryskiwanie – roztwór 0,05 %
Uprawa w gruncie: ◆ faza 7.–8. liścia właściwego (BBCH 17–18) ◇ faza 9 lub więcej liści/ korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 19/41–42) ◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) ◆ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha

BURAK ĆWIKŁOWY

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ faza 2–4 liści właściwych / 1–2 pary liści (BBCH 12–14)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31)	
◇ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43)	
◆ korzeń osiąga 40–70% typowej średnicy (BBCH 44–47)	