TYTANIT

ZAKRES STOSOWANIA:

— JABŁOŃ – OWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ zielony pąk: 1–2 zabiegi co 5–7 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ różowy pąk	
◆ początek kwitnienia	
◇ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości	

— JABŁOŃ – MŁODY NIEOWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych	

— JABŁOŃ – SZKÓŁKI DRZEWEK SZCZEPIONYCH PRZEZ OKULIZACJĘ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się podkładek): początek rozwoju liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści	
◆ 2. rok – wiosna (po ścięciu podkładki nad tarczką okulizacyjną): początek rozwoju pędu i liści	
◆ 2. rok – wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych	

— JABŁOŃ – SZKÓŁKI DRZEWEK SZCZEPIONYCH ZRAZAMI

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się zaszczepionych podkładek): początek rozwoju pędów i liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści	
◆ 2. rok – wiosna (10–14 dni po ścięciu pędu głównego na wysokość 60–65 cm): początek rozwoju pędów i liści	
◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych	

— GRUSZA – OWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ zielony pąk: 1–2 zabiegi co 5–7 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ biały pąk	
◆ początek kwitnienia	
◇ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości	

— CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek kwitnienia	
◆ rozwój zawiązków owoców	
◇ początek dojrzewania owoców	

— CZEREŚNIA – sady fertygowane – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek kwitnienia	
◆ rozwój zawiązków owoców	
◇ początek dojrzewania owoców	

WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek kwitnienia	
◆ rozwój zawiązków owoców	
◇ początek dojrzewania owoców	

ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek kwitnienia	
◆ rozwój zawiązków owoców	
◇ początek dojrzewania owoców	

BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek kwitnienia	
◆ rozwój zawiązków owoców	
◇ początek dojrzewania owoców	

NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek kwitnienia	
◆ rozwój zawiązków owoców	
◇ początek dojrzewania owoców	

MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆/◇ pękanie i rozwój pąków kwiatowych Zabieg należy traktować jako optymalny gdy temperatura powietrza pozwala na efektywne jego przeprowadzenie.	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek kwitnienia	
◆ rozwój zawiązków owoców	
◇ początek dojrzewania owoców	

AGREST

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ rozwój liści – do początku rozwoju kwiatostanów	
◇ bezpośrednio po zbiorze	

MALINA OWOCUJĄCA NA PĘDACH JEDNOROCZNYCH

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ rozwój liści i pędów: 2-3 zabiegi co 14-21 dni	
◆ początek kwitnienia	

MALINA OWOCUJĄCA NA PĘDACH DWULETNICH

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – pękanie pąków	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ rozwój liści i pędów: 2 zabiegi co 10–14 dni	
◆ początek kwitnienia	
◆ bezpośrednio po zbiorach	

— PORZECZKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – pękanie pąków	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ rozwój liści i pędów: 2 zabiegi co 10–14 dni	
◆ początek kwitnienia	
◇ bezpośrednio po zbiorze owoców, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny	

— BORÓWKA AMERYKAŃSKA – plantacje bez fertygacji – plantacje owocujące

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pąków	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek rozwoju liści i kwiatostanów	
◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia	
◆ po zbiorach owoców	

— WINOROŚL

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ początek rozwoju liści i nowych pędów	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ rozwój kwiatostanów	
◆ początek kwitnienia	

— TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią.

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: rozwój liści i koron	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ Lato – dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon	

— TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów	
◆ biały pąk	
◆ początek kwitnienia	
◇ początek rozwoju pierwszych owoców	

— TRUSKAWKA – plantacje fertygowane – Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Lato w roku sadzenia: po adaptacji roślin do warunków polowych – rozwinięty 5.–8. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ Wiosna: po wznowieniu wegetacji	
◆ początek rozwoju kwiatostanów	
◆ początek kwitnienia	
◆/◇ po zbiorach owoców Zabieg traktować jako optymalny w przypadku koszenia liści po zbiorach.	

— TRUSKAWKA – plantacje fertygowane – Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się sadzonek – rozwinięty 2.–3. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ rozwój liści	
◆ początek kwitnienia	
◆ rozwój i dojrzewanie pierwszych owoców	
◆ okres owocowania: 1–3 zabiegi co 14–21 dni	

— TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ Wiosna: rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów	
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach	
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek	

— TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów	
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach	
◆ SADZONKI DONICZKOWE: 5.-7. dzień po sadzonkowaniu	Podlewanie lub opryskiwanie: roztwór 0,02 – 0,04%

— TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ Wiosna: rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów	
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach	
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek	

— POMIDOR GRUNTOWY DO PRZETWÓRSTWA (PRZEMYSŁOWY)

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów	
◆ początek kwitnienia	
◇ rozwój owoców	

— POMIDOR NA ŚWIEŻY RYNEK

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów	
◆ początek kwitnienia	
◇ rozwój owoców	
◆ po kolejnych zbiorach	

— PAPRYKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ rozwój pierwszych pąków kwiatowych	
◆ początek kwitnienia	
◇ początek rozwoju owoców	
◇ po kolejnych zbiorach	

— WARZYWA PSIANKOWATE - produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	Podlewanie lub opryskiwanie: roztwór 0,02 – 0,04%

— OGÓREK – uprawa w polu lub pod osłonami

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	
◇ początek kwitnienia	
◆ po pierwszym zbiorze	
◆ po kolejnych zbiorach: 2–3 zabiegi co 10–14 dni	

CUKINIA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	
◇ początek kwitnienia	
◆ po pierwszym zbiorze	
◆ po kolejnych zbiorach: 1–3 zabiegi co 14–21 dni	

KABACZEK

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	
◇ początek kwitnienia	
◆ po pierwszym zbiorze	
◆ po kolejnych zbiorach: 1–3 zabiegi co 14–21 dni	

DYNIA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 10-14 dni	
◇ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju owoców	

MELON

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 10-14 dni	
◇ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju owoców	

ARBUZ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 10-14 dni	
◇ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju owoców	

WARZYWA DYNIOWATE – produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści	Podlewanie lub opryskiwanie: roztwór 0,02–0,04%

CEBULA – uprawa z siewu, w polu bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–5. liścia	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek formowania się główki cebuli	
◆ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości	

CEBULA – uprawa z rozsady, w polu bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek formowania się główki cebuli	
◆ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości	

CEBULA – uprawa z dymki, w polu bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–5. liścia	Zabiegi dolistnei – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek formowania się główki cebuli	
◆ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości	

CEBULA – produkcja dymki

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści – do początku formowania się główki cebuli	Zabieg dolistny – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha

CZOSNEK uprawa w polu bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–5. liścia	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek formowania się główki czosnku	
◆ główka czosnku osiąga 30–50% typowej wielkości	

POR – uprawa z rozsady, w polu bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ początkowy wzrost roślin: 2 zabiegi co 7–14	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ część przeznaczona do zbioru osiąga 30–50% typowej wielkości	

WARZYWA CEBULOWE - produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści	Podlewanie lub opryskiwanie: roztwór 0,02–0,04%

BROKUŁ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – wzrost liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek rozwoju róży	

KALAFIOR

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek rozwoju róży	

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek formowania się główki	

KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek formowania się główki	

KAPUSTA PEKIŃSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek formowania się główki	

KAPUSTA WŁOSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek formowania się główki	

KAPUSTA BRUKSELSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początek formowania się pąków bocznych (główek liściowych)	

KALAREPA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabieg dolistny – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha

RZODKIEWKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po wschodach roślin – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha

JARMUŻ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ intensywny wzrost masy liściowej	

WARZYWA KAPUSTNE – produkcja rozsady

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pierwszych liści właściwych	Podlewanie lub opryskiwanie: roztwór 0,02–0,04%

MARCHEW

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ korzeń zaczyna się poszerzać, średnica ›0,5 cm – korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 41–43)	
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47)	

PIETRUSZKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ korzeń zaczyna się poszerzać, średnica ›0,5 cm – korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 41–43)	
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47)	

PASTERNAK

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ korzeń zaczyna się poszerzać, średnica ›0,5 cm – korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 41–43)	
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47)	

SELER

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
Rozsada ◆ rozwinięty 1.–2. liść właściwy (BBCH 11–12)	Podlewanie lub opryskiwanie: roztwór 0,02–0,04%
Uprawa w gruncie ◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady ◆ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 19/41–42) ◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha

— BURAK ĆWIKŁOWY

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,2–0,4 L/ha
◆ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø >2 cm (BBCH 41–43)	

— SZKÓŁKI DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ od początku każdego sezonu wegetacyjnego: 2–3 zabiegi co 21–28 dni	Podlewanie lub opryskiwanie: roztwór 0,02–0,04%

— PRODUKCJA ROZSADY ROŚLIN OZDOBNYCH

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści: 1–2 zabiegi co 7–21	Podlewanie lub opryskiwanie: roztwór 0,02–0,04%
◆ początek rozwoju pąków kwiatowych	

— PRODUKCJA ROŚLIN OZDOBNYCH DONICZKOWYCH

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści: 2–3 zabiegi co 7–21 dni	Podlewanie lub opryskiwanie: roztwór 0,02–0,04%

— TRAWNIKI, POLA GOLFOWE

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ w okresie wegetacji: 2–5(8) zabiegi co 21–28 dni	Podlewanie lub opryskiwanie: roztwór 0,02–0,04%

— ROŚLINY OZDOBNE ZIELNE (jednoroczne, dwuletnie i byliny)

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści: po wschodach roślin uprawianych z siewu / po przyjęciu się sadzonek gatunków uprawianych z rozsady / po wznowieniu wegetacji wiosennej roślin dwuletnich i bylin	Podlewanie lub opryskiwanie: roztwór 0,02–0,04%
◆ intensywny wzrost roślin	
◆ przed kwitnieniem	

— DRZEWA I KRZEWY OZDOBNE

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ od wznowienia każdego sezonu wegetacyjnego – do końca lata: 2–3 zabiegi co 21–28 dni	Podlewanie lub opryskiwanie: roztwór 0,02–0,04%