# BORMAX®

## ZAKRES STOSOWANIA:

### — JABŁOŃ – OWOCUJĄCY SAD

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ zielony pąk | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–1,5 L/ha |
| ◆ początek kwitnienia | |
| ◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła | |
| ◇ początek rozwoju owoców | |
| ◆ po zbiorze owoców | |
| ◆ przed początkiem przebarwiania się liści | |

### — JABŁOŃ – MŁODY NIEOWOCUJĄCY SAD

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ Wiosna: rozwój liści | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–1,5 L/ha |
| ◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych | |
| ◇ Jesień: przed początkiem przebarwiania się liści | |

### — JABŁOŃ – SZKÓŁKI DRZEWEK SZCZEPIONYCH PRZEZ OKULIZACJĘ

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–1,5 L/ha |
| ◇ 1. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści | |
| ◇ 2. rok – wiosna (po ścięciu podkładki nad tarczką okulizacyjną): początek rozwoju pędu i liści | |
| ◆ 2. rok – wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych | |
| ◇ 2. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści | |

## — JABŁOŃ – SZKÓŁKI DRZEWEK SZCZEPIONYCH ZRAZAMI

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–1,5 L/ha |
| ◇ 1. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści | |
| ◇ 2. rok – wiosna (10–14 dni po ścięciu pędu głównego na wysokość 60–65 cm): początek rozwoju pędów i liści | |
| ◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych | |
| ◇ 2. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści | |

## — GRUSZA – OWOCUJĄCY SAD

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ zielony pąk | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–1,5 L/ha |
| ◆ początek kwitnienia | |
| ◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła | |
| ◇ początek rozwoju owoców | |
| ◆ po zbiorze owoców | |
| ◆ przed początkiem przebarwiania się liści | |

## — CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ rozwój pąków kwiatowych | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–1,5 L/ha |
| ◆ początek kwitnienia | |
| ◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści | |
| ◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni | |

## CZEREŚNIA – sady fertygowane – owocujący sad

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ rozwój pąków kwiatowych | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–1,5 L/ha |
| ◆ początek kwitnienia | |
| ◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści | |
| ◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni | |

## WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ rozwój pąków kwiatowych | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–1,5 L/ha |
| ◆ początek kwitnienia | |
| ◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści | |
| ◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni | |

## ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ rozwój pąków kwiatowych | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–1,5 L/ha |
| ◆ początek kwitnienia | |
| ◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści | |
| ◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni | |

## — BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ rozwój pąków kwiatowych | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–1,5 L/ha |
| ◆ początek kwitnienia | |
| ◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści | |
| ◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni | |

## — NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ rozwój pąków kwiatowych | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–1,5 L/ha |
| ◆ początek kwitnienia | |
| ◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści | |
| ◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni | |

## — MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◇/◆ pękanie i rozwój pąków kwiatowych<br>Zabieg należy traktować jako optymalny gdy temperatura powietrza pozwala na efektywne jego przeprowadzenie. | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–1,5 L/ha |
| ◆ początek kwitnienia | |
| ◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści | |
| ◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni | |

## AGREST

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – do początku rozwoju kwiatostanów | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ początek rozwoju owoców | |
| ◆ bezpośrednio po zbiorze | |
| ◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni | |

## MALINA OWOCUJĄCA NA PĘDACH JEDNOROCZNYCH

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 21–28 dni | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów | |
| ◆ początek kwitnienia | |
| ◆ początek rozwoju pierwszych owoców | |
| ◆ po zbiorach | |

## MALINA OWOCUJĄCA NA PĘDACH DWULETNICH

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ początek rozwoju kwiatostanów | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ początek kwitnienia | |
| ◆ początek rozwoju owoców | |
| ◆ bezpośrednio po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny | |
| ◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni | |

## PORZECZKA

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ początek rozwoju kwiatostanów | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ początek kwitnienia | |
| ◆ początek rozwoju owoców | |
| ◆ bezpośrednio po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–21 dni, przed okresem tworzenia pąków na kolejny sezon wegetacyjny | |
| ◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni | |

## BORÓWKA AMERYKAŃSKA – plantacja bez fertygacji – plantacje owocujące

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ rozwój pąków | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia | |
| ◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców | |
| ◆ po zbiorach owoców | |
| ◆ początek przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni | |

## BORÓWKA AMERYKAŃSKA – plantacje fertygowane – plantacje owocujące

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców | |
| ◆ po zbiorach owoców | |
| ◆ początek przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni | |

## WINOROŚL

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◇ początek rozwoju liści i nowych pędów | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ rozwój kwiatostanów | |
| ◆ koniec kwitnienia | |
| ◆ po zbiorze owoców | |

## TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią.

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ Jesień w roku sadzenia – przed spoczynkiem zimowym | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ Lato – dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon | |
| ◆ Jesień w pierwszym roku po posadzeniu – początek przebarwiania się liści | |

## TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące.

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ biały pąk | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ początek kwitnienia | |
| ◆ początek rozwoju pierwszych owoców | |
| ◆ po zbiorach | |
| ◆ początek przebarwiania się liści | |

## TRUSKAWKA – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych (polowe plantacje mateczne założone jesienią)

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |

## TRUSKAWKA – plantacje fertygowane – Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie.

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◇ Lato w roku sadzenia: po adaptacji roślin do warunków polowych – rozwinięty 5.–8. liść | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ Późne lato w roku sadzenia: dalszy rozwój liści i zawiązywanie pąków na przyszły sezon | |
| ◆ Jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści | |
| ◆ początek rozwoju kwiatostanów | |
| ◆ początek kwitnienia | |
| ◆ po zbiorach | |
| ◆ Jesień w pierwszym roku po posadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści | |

## TRUSKAWKA – plantacje fertygowane – Odmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – uprawa w gruncie.

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◇ po przyjęciu się sadzonek – rozwinięty 2.–3. liść | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ rozwój liści i kwiatostanów | |
| ◆ początek kwitnienia | |
| ◆ po zbiorach owoców | |
| ◆ przed początkiem przebarwiania się liści | |

## TRUSKAWKA – plantacje fertygowane – Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – uprawy w gruncie lub podłożach.

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◇ po przyjęciu się sadzonek – rozwinięty 2.–3. liść | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ rozwój liści | |
| ◆ dalszy rozwój liści i początek rozwoju pierwszych kwiatostanów | |
| ◆ początek kwitnienia | |
| ◆ okres owocowania: 2–4 zabiegi co 14–21 dni | |

## — TRUSKAWKA – produkcja sadzonek doniczkowanych (polowe plantacje mateczne założone jesienią)

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |

## — TRUSKAWKA – produkcja sadzonek frigo (polowe plantacje mateczne założone jesienią)

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek | |
| ◆ Początek jesieni: rozłogi z ukorzenionymi sadzonkami zakrywają międzyrzędzia *(jeżeli jest techniczna możliwość wykonania zabiegu)* | |

## — POMIDOR GRUNTOWY DO PRZETWÓRSTWA (PRZEMYSŁOWY)

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◇ intensywny wzrost roślin | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ początek rozwoju kwiatostanów | |
| ◆ początek kwitnienia | |
| ◆ rozwój owoców: 1–2 zabiegi co 7–21 dni | |
| ◇ dojrzewanie owoców | |

## — POMIDOR NA ŚWIEŻY RYNEK

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◇ intensywny wzrost roślin | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ rozwój kwiatostanów | |
| ◆ początek kwitnienia | |
| ◆ rozwój owoców: 1–2 zabiegi co 7–21 dni | |
| ◇ po kolejnych zbiorach | |

## — PAPRYKA

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◇ po przyjęciu się rozsady | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◇ intensywny wzrost roślin | |
| ◆ rozwój pierwszych pąków kwiatowych | |
| ◆ początek kwitnienia | |
| ◆początek rozwoju owoców: 1–2 zabiegi co 7–21 dni | |
| ◇ po kolejnych zbiorach | |

## — WARZYWA PSIANKOWATE – produkcja rozsady

| Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ rozwinięty 2.–3. liść właściwy | Opryskiwanie – roztwór 0,1–0,15% |

## — OGÓREK – uprawa w polu lub pod osłonami (w glebie lub substratach organicznych)

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ intensywny wzrost roślin: 2 zabiegi co 7–10 dni | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ po pierwszym zbiorze | |

## — CUKINIA

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ intensywny wzrost roślin: 2 zabiegi co 7–10 dni | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ po pierwszym zbiorze | |
| ◆ po kolejnych zbiorach: 1–2 zabiegi co 14–21 dni | |

## WARZYWA DYNIOWATE – produkcja rozsady

| Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ wzrost liści | Opryskiwanie – roztwór 0,1–0,15% |

## MELON

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ intensywny wzrost roślin: 2 zabiegi co 10–14 dni | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ początek rozwoju owoców | |

## DYNIA

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ intensywny wzrost roślin: 2 zabiegi co 10–14 dni | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ początek rozwoju owoców | |

## KABACZEK

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ intensywny wzrost roślin: 2 zabiegi co 7–10 dni | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ po pierwszym zbiorze | |
| ◆ po kolejnych zbiorach: 1–2 zabiegi co 14–21 dni | |

## ARBUZ

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ intensywny wzrost roślin: 2 zabiegi co 10–14 dni | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ początek rozwoju owoców | |

## CEBULA – uprawa z siewu, w polu – bez fertygacji

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◇ wzrost liści | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◇ początek formowania się główki cebuli | |

## CEBULA – uprawa z rozsady, w polu – bez fertygacji

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◇ wzrost liści | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◇ początek formowania się główki cebuli | |

## CEBULA – uprawa z dymki, w polu – bez fertygacji

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◇ wzrost liści | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◇ początek formowania się główki cebuli | |

## CEBULA – produkcja dymki

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◇ wzrost liści – do początku formowania się główki cebuli | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |

## CZOSNEK uprawa w polu – bez fertygacji

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◇ wzrost liści | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◇ początek formowania się główki czosnku | |

## — POR – uprawa z rozsady, w polu – bez fertygacji

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◇ początkowy wzrost roślin | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |

## — BROKUŁ

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ po przyjęciu się rozsady | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ wzrost liści | |
| ◇ początek rozwoju róży | |

## — KALAFIOR

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ po przyjęciu się rozsady | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ początek rozwoju róży | |
| ◇ początek rozwoju róży | |

## — KALAREPA

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ początek tworzenia zgrubienia | |

## — RZODKIEWKA

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◇ po wschodach roślin – rozwój liści | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ początek tworzenia zgrubienia | |

## KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◇ wzrost liści | |
| ◆ początek formowania się główki | |
| ◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości | |

## KAPUSTA PEKIŃSKA

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◇ wzrost liści | |
| ◆ początek formowania się główki | |

## KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◇ wzrost liści | |
| ◆ początek formowania się główki | |
| ◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości | |

## KAPUSTA WŁOSKA

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◇ wzrost liści | |
| ◆ początek formowania się główki | |
| ◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości | |

## KAPUSTA BRUKSELSKA

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ wzrost pędu głównego i liści | |
| ◆ początek formowania się pąków bocznych (główek liściowych) | |

## JARMUŻ

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◇ wzrost pędu głównego i liści | |

## MARCHEW

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ faza 4.–5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41) | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) | |
| ◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) | |
| ◆ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) | |

## PIETRUSZKA

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ faza 4.–5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41) | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) | |
| ◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) | |
| ◆ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) | |

## PASTERNAK

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ faza 4.–5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41) | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) | |
| ◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) | |
| ◆ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) | |

## SELER

| Terminy stosownaia (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| Rozsada:<br>◆ faza 2.–3. liścia właściwego (BBCH 12–13) | Podlewanie<br>roztwór 0,05–0,1%<br>Opryskiwanie<br>roztwór 0,25–0,3% |
| Uprawa w gruncie<br>◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18)<br>◆ korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 41–42)<br>◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)<br>◆ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48) | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |

## BURAK ĆWIKŁOWY

| Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14) | Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1,5 L/ha |
| ◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) | |
| ◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) | |
| ◆ korzeń osiąga 40–70% typowej średnicy (BBCH 44–47) | |

## WARZYWA KAPUSTNE – produkcja rozsady

| Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne): | Sposób aplikacji: |
|---|---|
| ◆ rozwój pierwszych liści właściwych | Podlewanie<br>roztwór 0,05–0,1%<br>Opryskiwanie<br>roztwór 0,25–0,3% |