FOSTAR

ZAKRES STOSOWANIA:

— JABŁOŃ – OWOCUJĄCY SAD – sady bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ zielony pąk	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ różowy pąk	
◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła	
◆ początek rozwoju owoców	
◇ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości	
◆ początek dojrzewania owoców: 1–2 zabiegi co 5–7 dni	
◇/◆ po zbiorze owoców Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.	

— JABŁOŃ – OWOCUJĄCY SAD – sady fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ zielony pąk	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ różowy pąk Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku niskiej temperatury gleby wczesną wiosną (<12°C).	
◆ początek rozwoju owoców	
◆ początek dojrzewania owoców: 1–2 zabiegi co 5–7 dni	
◇/◆ po zbiorze owoców Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.	

— JABŁOŃ – MŁODY NIEOWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych	

— JABŁOŃ – SZKÓŁKI DRZEWEK SZCZEPIONYCH PRZEZ OKULIZACJĘ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się podkładek): początek rozwoju liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści	
◆ 2. rok – wiosna (po ścięciu podkładki nad tarczką okulizacyjną): początek rozwoju pędu i liści	
◆ 2. rok – wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych	

— JABŁOŃ – SZKÓŁKI DRZEWEK SZCZEPIONYCH ZRAZAMI

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się zaszczepionych podkładek): początek rozwoju pędów i liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści	
◆ 2. rok – wiosna (10–14 dni po ścięciu pędu głównego na wysokość 60–65 cm): początek rozwoju pędów i liści	
◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych	

— GRUSZA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ zielony pąk	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ biały pąk	
◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła	
◆ początek rozwoju owoców	
◇ owoc osiąga 30–50% typowej wielkości	
◇/◆ początek dojrzewania owoców: 1–2 zabiegi co 5–7 dni Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku odmian o czerwonym zabarwieniu skórki.	
◇/◆ po zbiorze owoców Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.	

GRUSZA – OWOCUJĄCY SAD – sady fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ zielony pąk	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ biały pąk Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku niskiej temperatury gleby wczesną wiosną (<12°C).	
◆ początek rozwoju owoców	
◇ początek dojrzewania owoców: 1–2 zabiegi co 5–7 dni	
◇/◆ po zbiorze owoców Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji drzew po zbiorze.	

CZEREŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści	
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◇/◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy odmian o ciemnoczerwonym zabarwieniu owoców.	
◇ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	

CZEREŚNIA – sady fertygowane – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇/◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości Zabieg traktować jako optymalny w przypadku występowania warunków nie sprzyjających pobieraniu fosforu z gleby.	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇/◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy odmian o ciemnoczerwonym zabarwieniu owoców.	
◇ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	

WIŚNIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści	
◆ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości	
◇ po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	

BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści	
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości	
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości	
◇ po zbiorach owoców	

NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści	
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości	
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości	
◇ po zbiorach owoców	

MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ pękanie i rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści	
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości	
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości	
◇ po zbiorach owoców	

ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści	
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości	
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◇/◆ owoc osiąga 80–90% typowej wielkości Zabieg traktować jako optymalny w przypadku uprawy odmian o ciemnym zabarwieniu owoców.	
◇ po zbiorach owoców	

AGREST

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – pękanie pąków	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ rozwój liści – do początku rozwoju kwiatostanów	
◆ bezpośrednio po zbiorze	

— MALINA OWOCUJĄCA NA PĘDACH JEDNOROCZNYCH

Plantacje bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 21–28 dni	
◆ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów	
◆ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju pierwszych owoców	
◆ po kolejnych zbiorach: 1–2 zabiegi co 14–21 dni	

Plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇/◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 21–28 dni Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku braku możliwości stosowania fertygacji.	

— MALINA OWOCUJĄCA NA PĘDACH DWULETNICH

Plantacje bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów	
◆ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju owoców	
◆ po kolejnych zbiorach: 1–2 zabiegi co 14–21 dni	
◇ bezpośrednio po zbiorach	

Plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇/◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 10–14 dni Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku braku możliwości stosowania fertygacji.	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach	

PORZECZKA - plantacje bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów	
◆ początek kwitnienia	
◇ wzrost owoców: 1–2 zabiegi co 5–14 dni	
◇ wzrost owoców: 1–2 zabiegi co 5–14 dni	

PORZECZKA - plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆/◇ rozwój liści i pędów: 1–2 zabiegi co 10–14 dni. Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku braku możliwości stosowania fertygacji.	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◇ po zbiorze owoców: 1–2 zabiegi co 10–21 dni	

BORÓWKA AMERYKAŃSKA – plantacja bez fertygacji – plantacje owocujące

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój pąków	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ początkowy rozwój liści i kwiatostanów	
◇ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia	
◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców	
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 2 zabiegi co 10–14 dni	
◇ po zbiorach owoców	

BORÓWKA AMERYKAŃSKA – plantacje fertygowane – plantacje owocujące

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ początek rozwoju liści i kwiatostanów	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha

— WINOROŚL

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ początek rozwoju liści i nowych pędów	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ rozwój kwiatostanów	
◇ koniec kwitnienia	
◆ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu	

— TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Jesień w roku sadzenia: przed spoczynkiem zimowym	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ Wiosna: rozwój liści i koron	
◆ Lato: dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon	

— TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ biały pak	
◇ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju owoców	
◆ początek dojrzewania owoców	
◆ po zbiorach owoców	

— TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ Wiosna: rozwój liści	
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów	
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach	
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek	

— TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: rozwój liści	
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów	
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 2.–3. dzień po sadzonkowaniu	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%
◆ SADZONKI DONICZKOWANE: 5.–7. dzień po sadzonkowaniu	
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 14.–21. dzień po sadzonkowaniu	

— TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 3–6 L/ha
◆ Wiosna: rozwój liści	
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów	
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach	
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek	

— POMIDOR GRUNTOWY DO PRZETWÓRSTWA (PRZEMYSŁOWY) – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◆/◇ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 5–7 dni Termin zabiegu traktować jako optymalny w warunkach niskiej temperatury oraz w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu, a także w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0).	
◆ początek rozwoju kwiatostanów	
◆ początek kwitnienia	
◇ rozwój owoców	
◆/◇ dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 7–21 dni Termin zabiegu traktować jako optymalny w warunkach niskiej temperatury oraz w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu, a także w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0).	

— POMIDOR GRUNTOWY DLA PRZETWÓRSTWA (PRZEMYSŁOWY) – uprawa w polu – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◆/◇ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 5–7 dni Termin zabiegu traktować jako optymalny w warunkach niskiej temperatury oraz w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu, a także w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0).	
◆ rozwój kwiatostanów – początek kwitnienia	
◇ rozwój owoców	

— POMIDOR NA ŚWIEŻY RYNEK – uprawa w glebie lub substratach organicznych – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◆/◇ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 5–7 dni Termin zabiegu traktować jako optymalny w warunkach niskiej temperatury oraz w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu, a także w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0).	
◆ rozwój pierwszych kwiatostanów – początek kwitnienia	
◇ początek rozwoju owoców	
◇ po kolejnych zbiorach: 1–2 zabiegi co 7–21 dni	

— PAPRYKA - uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◆/◇ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 5–7 dni Termin zabiegu traktować jako optymalny w warunkach niskiej temperatury oraz w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu, a także w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0).	
◇ rozwój pierwszych pąków kwiatowych	
◆ początek kwitnienia	
◇ początek rozwoju owoców	
◆ po kolejnych zbiorach: 1–2 zabiegi co 7–21 dni	

— PAPRYKA – uprawa w glebie lub substratach organicznych – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◆/◇ intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 5–7 dni Termin zabiegu traktować jako optymalny w warunkach niskiej temperatury oraz w przypadku odmian o wysokich wymaganiach w stosunku do fosforu, a także w warunkach utrudnionego pobierania fosforu z gleby (np. niska zasobność gleby w fosfor, okresowe niedobory wody, gleby o pH poniżej 6,0 lub powyżej 7,0).	
◇ rozwój pierwszych pąków kwiatowych	
◆ początek kwitnienia	
◇ początek rozwoju owoców	
◇ po kolejnych zbiorach: 1–2 zabiegi co 7–21 dni	

— WARZYWA PSIANKOWATE - produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści: 2–3 zabiegi co 7–14 dni	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%

OGÓREK – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin	
◇ początek kwitnienia	
◆ po pierwszym zbiorze	

CUKINIA – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin	
◇ początek kwitnienia	
◆ po pierwszym zbiorze	

KABACZEK – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin	
◇ początek kwitnienia	
◆ po pierwszym zbiorze	

DYNIA – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin	
◆ początek kwitnienia	
◇ początek rozwoju owoców	

— MELON – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin	
◆ początek kwitnienia	
◇ początek rozwoju owoców	

— ARBUZ – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin	
◆ początek kwitnienia	
◇ początek rozwoju owoców	

— WARZYWA DYNIOWATE – produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%
◇ 3–5 dni przed wysadzeniem rozsady	

— CEBULA – uprawa z siewu, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–5. liścia	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◆ wzrost liści	
◇ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości	

— CEBULA – uprawa z rozsady, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści: 2 zabiegi co 7–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◇ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości	

— CEBULA – uprawa z dymki, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–5. liścia	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◆ wzrost liści	
◇ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości	

— CEBULA – produkcja dymki

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści – do początku formowania się główki cebuli	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◇ wzrost główki cebuli	

— CZOSNEK

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–5. liścia	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◆ wzrost liści	
◇ główka czosnku osiąga 30–50% typowej wielkości	

— POR – uprawa z rozsady, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ początkowy wzrost roślin: 2 zabiegi co 7–14	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◇ część przeznaczona do zbioru osiąga 30–50% typowej wielkości	

WARZYWA CEBULOWE – produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%

BROKUŁ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◇ wzrost liści	
◇ początek rozwoju róży	

KALAFIOR

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◇ wzrost liści	
◇ początek rozwoju róży	

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◇ wzrost liści	
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	

KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◇ wzrost liści	
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	

KAPUSTA PEKIŃSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◇ wzrost liści	
◇ główka osiąga 30–70% typowej wielkości (BBCH 43–47)	

KAPUSTA WŁOSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◇ wzrost liści	
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	

KAPUSTA BRUKSELSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◇ wzrost pędu głównego i liści	
◇ ok. 50% główek uformowanych	

KALAREPA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ początek tworzenia zgrubienia	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha

RZODKIEWKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ początek tworzenia zgrubienia	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha

— JARMUŻ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◇ utworzone ok. 50% masy liściowej	

— WARZYWA KAPUSTNE – produkcja rozsady

Terminy stosowanie (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój pierwszych liści właściwych: 1–2 zabiegi co 7–10 dni	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%

— MARCHEW

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 15/41–43)	
◇ korzeń osiąga ok. 40% typowej średnicy (BBCH 44)	
◇ korzeń osiąga ok. 50% typowej średnicy (BBCH 45)	

— PIETRUSZKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 15/41–43)	
◇ korzeń osiąga ok. 40% typowej średnicy (BBCH 44)	
◇ korzeń osiąga ok. 50% typowej średnicy (BBCH 45)	

PASTERNAK

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–4. liścia (BBCH 13–14)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◆ faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 15/41–43)	
◇ korzeń osiąga ok. 40% typowej średnicy (BBCH 44)	
◇ korzeń osiąga ok. 50% typowej średnicy (BBCH 45)	

SELER

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
Rozsada: ◆ rozwinięty 1. liść właściwy – faza 3. liścia właściwego (BBCH 11–13)	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%
Uprawa w gruncie: ◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) ok. 7 dni po wysadzeniu rozsady ◆ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 30% typowej średnicy (BBCH 19/41–43) ◇ korzeń osiąga ok. 40% typowej średnicy (BBCH 44) ◇ korzeń osiąga ok. 50% typowej średnicy (BBCH 45)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha

BURAK ĆWIKŁOWY

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 2–4 liści właściwych /1–2 pary liści (BBCH 12–14)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 2–6 L/ha
◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31)	
◇ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43)	

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH WIELOLETNICH

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po ukorzenianiu sadzonek/rozsady lub w okresach pozimowej regeneracji sytemu korzeniowego 1–2 zabiegi co 7–14 dni	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%
◇ przed wystąpieniem chłodów wiosennych	
◆ w okresie przygotowania roślin do zimy	

— SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH JEDNOROCZNYCH

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ od okresu ukorzeniania sadzonek/rozsady 1–3 zabiegi co 7–14 dni	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%

— ROŚLINY OZDOBNE

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ w okresie ukorzeniania i w początkowych fazach rozwoju roślin 1–3 zabiegi co 7–14 dni	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%
◆ przed kwitnieniem i/lub na początku kwitnienia 1–2 zabiegi co 7–14	
◇ w przypadku roślin wieloletnich wykonać dodatkowo 1–2 zabiegi co 7–14 dni w okresie jesiennym w celu zwiększenia zimotrwałości roślin	

— ROŚLINY OZDOBNE

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po ruszeniu wegetacji wiosennej 1–2 zabiegi co 7–14 dni (dla regeneracji systemu korzeniowego po zimie i szybszego rozwoju roślin)	Roztwór 0,25–0,3%
◆ w okresie jesiennym 1–2 zabiegi co 7–14 dni (dla zwiększenia zimotrwałości)	