MIKROVIT CYNK

ZAKRES STOSOWANIA:

JABŁOŃ – OWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wznowienie wegetacji – pękanie pąków	
◆ faza „mysie ucho”	
◇ różowy pąk	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–2 L/ha
◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła	
◆ po zbiorze owoców	
◆ przed początkiem przebarwiania się liści	

JABŁOŃ – MŁODY NIEOWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji
◆ Wiosna: po przyjęciu się drzewek – pękanie pąków liściowych	
◆ rozwój liści	
◇/◆ wzrost pędu głównego i pędów bocznych Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 7 (pomiar w wodzie).	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–2 L/ha
◇ Jesień: przed początkiem przebarwiania się liści	

JABŁOŃ – SZKÓŁKI DRZEWEK SZCZEPIONYCH PRZEZ OKULIZACJĘ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji
◇ 1. rok – lato (ok. 3–4 tygodnie po okulizacji): zakończenie wzrostu pędów i liści	
◇ 1. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści	
◇/◆ 2. rok – wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 7 (pomiar w wodzie).	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–2 L/ha
◇ 2. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści	

— JABŁOŃ – SZKÓŁKI DRZEWEK SZCZEPIONYCH ZRAZAMI

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji
◇ 1. rok – lato: wzrost pędu głównego i rozwój liści	
◇ 1. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści	
◆ 2. rok – wiosna (10–14 dni po ścięciu pędu głównego na wysokość 60–65 cm): początek rozwoju pędów i liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–2 L/ha
◇/◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach o pH powyżej 7 (pomiar w wodzie).	
◇ 2. rok – jesień: przed początkiem przebarwiania się liści	

— GRUSZA – OWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wznowienie wegetacji – pękanie pąków	
◆ faza „mysie ucho”	
◇ biały pąk	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–2 L/ha
◆ koniec kwitnienia: większość płatków opadła	
◆ po zbiorze owoców	
◆ przed początkiem przebarwiania się liści	

— CZEREŚNIA – OWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ nabrzmiewanie / pękanie pąków	
◆ rozwój pąków kwiatowych	
◆ rozwój zawiązków owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–2 L/ha
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–3 zabiegi, co 10–14 dni	

— WIŚNIA – OWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ nabrzmiewanie / pękanie pąków	
◆ rozwój pąków kwiatowych	
◆ rozwój zawiązków owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–2 L/ha
◇ owoc osiąga ok. połowę typowej wielkości	
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–3 zabiegi, co 10–14 dni	

— ŚLIWA – OWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ nabrzmiewanie / pękanie pąków	
◆ rozwój pąków kwiatowych	
◆ rozwój zawiązków owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–2 L/ha
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości	
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	

— BRZOSKWINIA – OWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ nabrzmiewanie / pękanie pąków	
◆ rozwój pąków kwiatowych	
◆ rozwój zawiązków owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–2 L/ha
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości	
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	

— NEKTARYNA – OWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ nabrzmiewanie / pękanie pąków	
◆ rozwój pąków kwiatowych	
◆ rozwój zawiązków owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–2 L/ha
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości	
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	

— MORELA – OWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ nabrzmiewanie / pękanie pąków	
◆ rozwój pąków kwiatowych	
◆ rozwój zawiązków owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 1–2 L/ha
◆ owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości	
◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	

— AGREST

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – do początku rozwoju kwiatostanów ◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— MALINA OWOCUJĄCA NA PĘDACH DWULETNICH

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – rozwój liści ◆ wzrost liści i pędów ◆ początek rozwoju kwiatostanów ◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— MALINA OWOCUJĄCA NA PĘDACH JEDNOROCZNYCH

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: wznowienie wegetacji ◇ wzrost liści i pędów ◆ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów ◆ po zbiorach	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— PORZECZKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – pękanie pąków ◆ rozwój liści i pędów ◆ początek rozwoju kwiatostanów ◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	Zabiegi dolistne -jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— BORÓWKA AMERYKAŃSKA – plantacje owocujące

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ pękanie pąków ◆ przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni	Zabiegi dolistne -jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— WINOROŚL

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ początek rozwoju liści i nowych pędów ◆ rozwój kwiatostanów ◇ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu ◆ po zbiorze owoców	Zabiegi dolistne -jednorazowa dawka 1–2 L/ha

— TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią.

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści ◇ Wiosna: rozwój liści i koron ◆ Jesień w pierwszym roku po posadzeniu: przed początkiem przebarwiania się liści	Zabiegi dolistne -jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące.

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści, 2 zabiegi co 7–14 dni ◆ początek rozwoju kwiatostanów ◆ Jesień: przed początkiem przebarwiania się liści, 1–2 zabiegi co 10–14 dni	Zabiegi dolistne -jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— TRUSKAWKA – plantacje fertygowane – Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie.

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści ◆ Wiosna: po wznowieniu wegetacji ◇ początek rozwoju kwiatostanów ◆ Jesień w pierwszym roku po posadzeniu: przed początkiem przebarwiania się liści	Zabiegi dolistne -jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— TRUSKAWKA – plantacje fertygowane – Odmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – Uprawa w gruncie.

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇/◆ rozwój liści i kwiatostanów Zabieg traktować jako optymalny w warunkach ograniczonego pobierania cynku przez korzenie. ◆ przed początkiem przebarwiania się liści	Zabiegi dolistne -jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— TRUSKAWKA – plantacje fertygowane – Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój liści ◆ dalszy rozwój liści i początek rozwoju pierwszych kwiatostanów ◇ zawiązywanie kolejnych owoców / rozwój i dojrzewanie kolejnych owoców / kolejne zbiory owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni	Zabiegi dolistne -jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Jesień w roku sadzania: przed początkiem przebarwiania się liści ◆ Wiosna: rozwój liści ◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów ◇ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek	Zabiegi dolistne -jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – jesień w roku sadzenia: przed początkiem przebarwiania się liści ◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: rozwój liści ◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów	Zabiegi dolistne -jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Jesień w roku sadzenia – przed spoczynkiem zimowym ◆ Wiosna: rozwój liści ◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów ◇ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek ◆ Początek jesieni: rozłogi z ukorzenionymi sadzonkami zakrywają międzyrzędzia *(jeżeli jest techniczna możliwość wykonania zabiegu)*	Zabiegi dolistne -jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— POMIDOR

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady – intensywny wzrost roślin ◇ początek rozwoju kwiatostanów	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— PAPRYKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady – intensywny wzrost roślin ◇ rozwój pierwszych pąków kwiatowych	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— OGÓREK – uprawa w polu lub pod osłonami (w glebie lub substratach organicznych)

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść ◇ intensywny wzrost roślin	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— CUKINIA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść ◇ intensywny wzrost roślin	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— KABACZEK

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść ◇ intensywny wzrost roślin	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— DYNIA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść ◇ intensywny wzrost roślin	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— MELON

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść ◇ intensywny wzrost roślin	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

ARBUZ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść ◇ intensywny wzrost roślin	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

CEBULA – uprawa z siewu, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści ◇/◆ początek formowania się główki cebuli Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach alkalicznych.	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

CEBULA – uprawa z rozsady, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści ◇/◆ początek formowania się główki cebuli Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach alkalicznych.	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

CEBULA – produkcja dymki

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści – do początku formowania się główki cebuli	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

CEBULA – uprawa z dymki, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści ◇/◆ początek formowania się główki cebuli Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach alkalicznych.	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

CZOSNEK uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści ◇/◆ początek formowania się główki czosnku Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach alkalicznych.	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— POR

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ początkowy wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 7–14	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— BROKUŁ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści ◇ początek rozwoju róży	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— KALAFIOR

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści ◇ początek rozwoju róży	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści ◇ początek formowania się główki	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści ◇ początek formowania się główki	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— KAPUSTA WŁOSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści ◇ początek formowania się główki	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

— KAPUSTA PEKIŃSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści ◇ początek formowania się główki	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

KAPUSTA BRUKSELSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost pędu głównego i liści ◇ początek formowania się pąków bocznych (główek liściowych)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

KALAREPA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

RZODKIEWKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

JARMUŻ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści ◇ wzrost pędu głównego i liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

MARCHEW

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ faza 3.–4. liścia właściwego (BBCH 13–14) ◆ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42) ◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

PIETRUSZKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42) ◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

PASTERNAK

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać – korzeń osiąga 20% typowej średnicy (BBCH 15/41–42) ◇ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

SELER

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18) ◇ faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 19/41)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha

BURAK ĆWIKŁOWY

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31) ◇ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–2 L/ha