MIKROVIT MOLIBDEN

ZAKRES STOSOWANIA:

— JABŁOŃ – OWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ zielony pąk	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◇ początek rozwoju owoców	

— JABŁOŃ – MŁODY NIEOWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ Wiosna: rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◆ Wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych	

— JABŁOŃ – SZKÓŁKI DRZEWEK SZCZEPIONYCH PRZEZ OKULIZACJĘ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się podkładek): początek rozwoju liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◇ 2. rok – wiosna (po ścięciu podkładki nad tarczką okulizacyjną): początek rozwoju pędu i liści	
◆ 2. rok – wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych	

— JABŁOŃ – SZKÓŁKI DRZEWEK SZCZEPIONYCH ZRAZAMI

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ 1. rok – wiosna (po przyjęciu się zaszczepionych podkładek): początek rozwoju pędów i liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◇ 2. rok – wiosna (10–14 dni po ścięciu pędu głównego na wysokość 60–65 cm): początek rozwoju pędów i liści	
◆ 2. rok –wiosna/lato: wzrost pędu głównego i pędów bocznych	

GRUSZA – OWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ zielony pąk	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◇ początek rozwoju owoców	

CZEREŚNIA – OWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◇ po zbiorach owoców	

WIŚNIA – OWOCUJĄCY SAD

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◇ po zbiorach owoców	

BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◇ po zbiorach owoców	

NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◇ po zbiorach owoców	

MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◇ po zbiorach owoców	

ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ koniec kwitnienia / początek rozwoju liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◇ po zbiorach owoców	

BORÓWKA AMERYKAŃSKA – plantacje bez fertygacji – plantacje owocujące

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ początkowy rozwój liści i kwiatostanów	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◇ rozwój i dojrzewanie owoców	
◇ po zbiorach owoców	

BORÓWKA AMERYKAŃSKA – plantacje fertygowane – plantacje owocujące

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ początek rozwoju liści i kwiatostanów	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha

PORZECZKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój liści i pędów	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha

MALINA OWOCUJĄCA NA PĘDACH JEDNOROCZNYCH

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój liści i pędów	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha

MALINA OWOCUJĄCA NA PĘDACH DWULETNICH

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój liści i pędów	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha

WINOROŚL

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ początek rozwoju liści i nowych pędów	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◇ rozwój kwiatostanów	
◇ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu	

TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią.

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ Wiosna – rozwój liści i koron	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha

TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje owocujące.

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści, 2 zabiegi co 7–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◇ po zbiorach owoców	

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ Wiosna: rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu rozłogów	

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów	

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ Wiosna: rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ Wiosna: początek wzrostu rozłogów	

POMIDOR GRUNTOWY DO PRZETWÓRSTWA (PRZEMYSŁOWY)

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha

POMIDOR NA ŚWIEŻY RYNEK

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ początek rozwoju owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha

PAPRYKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ początek rozwoju owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha

OGÓREK – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ intensywny wzrost roślin	
◇ początek kwitnienia	

CUKINIA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ intensywny wzrost roślin	
◇ początek kwitnienia	

KABACZEK

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ intensywny wzrost roślin	
◇ początek kwitnienia	

DYNIA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ intensywny wzrost roślin	
◇ początek kwitnienia	
◇ wzrost owoców	

MELON

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ intensywny wzrost roślin	
◇ początek kwitnienia	
◇ wzrost owoców	

— ARBUZ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5 L/ha
◇ intensywny wzrost roślin	
◇ początek kwitnienia	
◇ wzrost owoców	

— CEBULA – uprawa z siewu, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–5. liścia	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◆ początek formowania się główki cebuli	
◇ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości	

— CEBULA – uprawa z rozsady, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◆ początek formowania się główki cebuli	
◇ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości	

— CEBULA – uprawa z dymki, w polu – bez

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–5. liścia	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◆ początek formowania się główki cebuli	
◇ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości	

— KALAREPA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha

CZOSNEK uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 3.–5. liścia	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◆ początek formowania się główki czosnku	
◇ główka czosnku osiąga 30–50% typowej wielkości	

POR – uprawa z rozsady, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ początkowy wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 7–14	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◇ część przeznaczona do zbioru osiąga 30–50% typowej wielkości	

BROKUŁ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◆ wzrost liści	

KALAFIOR

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ po przyjęciu się rozsady	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◆ wzrost liści	

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ o przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◆ wzrost liści	
◇/◆ początek formowania się główki Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych, a także w przypadku odmian o długim okresie wegetacji.	
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	

KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ o przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◆ wzrost liści	
◇/◆ początek formowania się główki Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych, a także w przypadku odmian o długim okresie wegetacji.	
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	

KAPUSTA PEKIŃSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◆ wzrost liści	
◇/◆ początek formowania się główki Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych, a także w przypadku odmian o długim okresie wegetacji.	
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	

KAPUSTA WŁOSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ o przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◆ wzrost liści	
◇/◆ początek formowania się główki Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadku uprawy na glebach kwaśnych, a także w przypadku odmian o długim okresie wegetacji.	
◇ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	

KAPUSTA BRUKSELSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◆ wzrost pędu głównego i liści	

— RZODKIEWKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha

— JARMUŻ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◆ wzrost pędu głównego i liści	
◇ utworzone ok. 50% masy liściowej	

— WARZYWA KAPUSTNE – produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	Podlewanie roztwór 0,05–0,1% Opryskiwanie roztwór 0,25–0,3%

— MARCHEW

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 5.–8. liścia właściwego (BBCH 15–17)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47)	

— PIETRUSZKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 5.–8. liścia właściwego (BBCH 15–17)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47)	

BURAK ĆWIKŁOWY

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◇ korzeń osiąga 40–70% typowej średnicy (BBCH 44–47)	

PASTERNAK

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 5.–8. liścia właściwego (BBCH 15–17)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47)	

SELER

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
Rozsada: ◆ faza 2.–3. liścia właściwego (BBCH 12–13)	Podlewanie roztwór 0,05–0,1% Opryskiwanie roztwór 0,25–0,3%
Uprawa w gruncie ◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18) ◆ korzeń osiąga 50–80% typowej średnicy (BBCH 45–48)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 0,5–1 L/ha