WAPNOVIT TURBO

ZAKRES STOSOWANIA:

— JABŁOŃ – OWOCUJĄCY SAD – sady bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ koniec kwitnienia: większość płatków opadła	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◇ początek rozwoju owoców	
◆ wzrost owoców: 3–5 zabiegów co 7–14 dni	
◆ początek dojrzewania owoców: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	

— JABŁOŃ – OWOCUJĄCY SAD – sady fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji
◇ początek rozwoju owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha.
◆ wzrost owoców: 2–3 zabiegi co 7–21 dni	
◆ początek dojrzewania owoców: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	

— GRUSZA – OWOCUJĄCY SAD – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ koniec kwitnienia: większość płatków opadła	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost owoców: 3–4 zabiegów co 7–14 dni	
◆ początek dojrzewania owoców	

— GRUSZA – OWOCUJĄCY SAD – sady fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ początek rozwoju owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost owoców: 2–3 zabiegi co 7–21 dni	
◆ początek dojrzewania owoców	

— CZEREŚNIA – OWOCUJĄCY SAD – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój zawiązków owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost owoców: 3 zabiegi co 5–7 dni	
◆ początek dojrzewania owoców	
◇ **Zapobieganie pękaniu owoców:** każdorazowo bezpośrednio przed spodziewanym deszczem lub w trakcie deszczu (roztwór 0,1–0,3%)	

— CZEREŚNIA – OWOCUJĄCY SAD – sady fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost owoców: 3 zabiegi co 5–7 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ początek dojrzewania owoców	
◇ **Zapobieganie pękaniu owoców:** każdorazowo bezpośrednio przed spodziewanym deszczem lub w trakcie deszczu (roztwór 0,1–0,3%)	

— WIŚNIA – OWOCUJĄCY SAD – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój zawiązków owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost owoców: 3 zabiegi co 5–7 dni	
◆ początek dojrzewania owoców	
◇ **Zapobieganie pękaniu owoców:** każdorazowo bezpośrednio przed spodziewanym deszczem lub w trakcie deszczu (roztwór 0,1–0,3%)	

— WIŚNIA – OWOCUJĄCY SAD – sady fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost owoców: 3 zabiegi co 5–7 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ początek dojrzewania owoców	
◇ **Zapobieganie pękaniu owoców:** każdorazowo bezpośrednio przed spodziewanym deszczem lub w trakcie deszczu (roztwór 0,1–0,3%)	

— ŚLIWA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój związków owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost owoców: 4–5 zabiegów co 7–10 dni	
◆ początek dojrzewania owoców	

— MORELA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój związków owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost owoców: 4–5 zabiegów co 7–10 dni	
◆ początek dojrzewania owoców	

— BRZOSKWINIA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój związków owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost owoców: 4–5 zabiegów co 7–10 dni	
◆ początek dojrzewania owoców	

— NEKTARYNA – sady bez fertygacji – owocujący sad

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój związków owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost owoców: 4–5 zabiegów co 7–10 dni	
◆ początek dojrzewania owoców	

— AGREST

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost owoców – do początku dojrzewania: 1–3 zabiegi co 7–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha

— MALINA OWOCUJĄCA NA PĘDACH JEDNOROCZNYCH

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ początek rozwoju pierwszych owoców	
◆ po kolejnych zbiorach: 3–4 zabiegi co 5–14 dni	

— MALINA OWOCUJĄCA NA PĘDACH DWULETNICH

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ początek rozwoju pierwszych kwiatostanów	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ początek rozwoju owoców	
◆ po kolejnych zbiorach: 3–4 zabiegi co 5–7 dni	

— PORZECZKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ początek rozwoju kwiatostanów	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ początek rozwoju owoców	
◆ wzrost owoców	
◇ początek dojrzewania owoców	

— BORÓWKA AMERYKAŃSKA – plantacje bez fertygacji – plantacje owocujące

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 2–3 zabiegi co 10–14 dni	

— BORÓWKA AMERYKAŃSKA – plantacje fertygowane – plantacje owocujące

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ od początku rozwoju owoców: 2–3 zabiegi co 10–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha

— WINOROŚL

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój owoców – do fazy jagód wielkości grochu	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ jagody zaczynają stykać się ze sobą	
◆ początek dojrzewania owoców	
◇ wybarwianie się owoców	

— TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Wiosna – rozwój liści i koron	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ Lato – dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon	

— TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ biały pąk	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ początek rozwoju owoców	
◆ początek dojrzewania owoców	
◆ bezpośrednio po pierwszym zbiorze	
◇ w okresie zbiorów owoców, 1–2 zabiegi co 3–5 dni	

— TRUSKAWKA – plantacje fertygowane – Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie.

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ początek rozwoju pierwszych owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 2–3 zabiegi co 5–10 dni	

— TRUSKAWKA – plantacje fertygowane – Odmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – Uprawa w gruncie.

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ początek rozwoju pierwszych owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ rozwój i dojrzewanie owoców: 2–3 zabiegi co 5–10 dni	

— TRUSKAWKA – plantacje fertygowane – Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach.

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ początek rozwoju pierwszych owoców	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ rozwój i dojrzewanie pierwszych owoców: 2 zabiegi co 5–7 dni	
◆ okres owocowania: 3–5 zabiegów co 14–28 dni	

— TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ Lato: rozwój, wzrost i ukorzenianie się sadzonek	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha

— POMIDOR GRUNTOWY DO PRZETWÓRSTWA (PRZEMYSŁOWY) – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady – intensywny wzrost roślin	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ początek rozwoju kwiatostanów	
◆ początek kwitnienia	
◆ rozwój owoców: 2–3 zabiegi co 7–14 dni	
◆ dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	

— POMIDOR GRUNTOWY DLA PRZETWÓRSTWA (PRZEMYSŁOWY) – uprawa w polu – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój kwiatostanów – początek kwitnienia: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ rozwój owoców: 1–3 zabiegi co 7–14 dni	
◆ dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	

— POMIDOR NA ŚWIEŻY RYNEK – uprawa w glebie lub substratach organicznych – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwój pierwszych kwiatostanów – początek kwitnienia: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ rozwój owoców: 1–3 zabiegi co 7–14 dni	
◆ dojrzewanie owoców: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	

— PAPRYKA – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady – intensywny wzrost roślin	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ rozwój pierwszych pąków kwiatowych	
◆ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju owoców: 2–3 zabiegi co 7–14 dni	
◆ po kolejnych zbiorach: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	

— PAPRYKA – uprawa w glebie lub substratach organicznych – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady – intensywny wzrost roślin	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◇ rozwój pierwszych pąków kwiatowych	
◇ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju owoców: 1-2 zabiegi co 7–14 dni	
◆ po kolejnych zbiorach: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	

— WARZYWA PSIANKOWATE - produkcja rozsady

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwój liści: 1–2 zabiegi co 7–14 dni	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%

— OGÓREK – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin	
◆ początek kwitnienia	
◆ po pierwszym zbiorze	
◆ po kolejnych zbiorach: 1–3 zabiegi co 7–14 dni	

— OGÓREK – uprawa w polu lub pod osłonami (w glebie lub substratach organicznych) – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◇ intensywny wzrost roślin	
◇ początek kwitnienia	
◇ po pierwszym zbiorze	
◇ po kolejnych zbiorach: 1–3 zabiegi co 7–14 dni	

— CUKINIA – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin	
◆ początek kwitnienia	
◆ po pierwszym zbiorze	
◆ po kolejnych zbiorach: 1–3 zabiegi co 14–21 dni	

CUKINIA – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◇ intensywny wzrost roślin	
◇ początek kwitnienia	
◇ po pierwszym zbiorze	
◇ po kolejnych zbiorach: 1–3 zabiegi co 14–21 dni	

KABACZEK – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ intensywny wzrost roślin	
◆ początek kwitnienia	
◆ po pierwszym zbiorze	
◆ po kolejnych zbiorach: 1–3 zabiegi co 14–21 dni	

KABACZEK – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◇ intensywny wzrost roślin	
◇ początek kwitnienia	
◇ po pierwszym zbiorze	
◇ po kolejnych zbiorach: 1–3 zabiegi co 14–21 dni	

DYNIA – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◇ intensywny wzrost roślin	
◇ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju owoców	
◆ wzrost owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni	

DYNIA – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◇ intensywny wzrost roślin	
◇ początek kwitnienia	
◇ początek rozwoju owoców	
◇ wzrost owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni	

MELON – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◇ intensywny wzrost roślin	
◇ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju owoców	
◆ wzrost owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni	

— MELON – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◇ intensywny wzrost roślin	
◇ początek kwitnienia	
◇ początek rozwoju owoców	
◇ wzrost owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni	

— ARBUZ – uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◇ intensywny wzrost roślin	
◇ początek kwitnienia	
◆ początek rozwoju owoców	
◆ wzrost owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni	

— ARBUZ – plantacje fertygowane

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ rozwinięty 3.–6. liść	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◇ intensywny wzrost roślin	
◇ początek kwitnienia	
◇ początek rozwoju owoców	
◇ wzrost owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni	

— WARZYWA DYNIOWATE – produkcja rozsady

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%

CEBULA – uprawa z siewu, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◇/◆ początek formowania się główki cebuli Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadkach takich jak: niska lub średnia zawartość wapnia w glebie, wysoka temperatura, zalanie systemu korzeniowego.	
◇/◆ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadkach takich jak: niska lub średnia zawartość wapnia w glebie, wysoka temperatura, zalanie systemu korzeniowego.	

CEBULA – uprawa z rozsady, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◇/◆ początek formowania się główki cebuli Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadkach takich jak: niska lub średnia zawartość wapnia w glebie, wysoka temperatura, zalanie systemu korzeniowego.	
◇/◆ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadkach takich jak: niska lub średnia zawartość wapnia w glebie, wysoka temperatura, zalanie systemu korzeniowego.	

CEBULA – uprawa z dymki, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◇/◆ początek formowania się główki cebuli Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadkach takich jak: niska lub średnia zawartość wapnia w glebie, wysoka temperatura, zalanie systemu korzeniowego.	
◇/◆ główka cebuli osiąga 30–50% typowej wielkości Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadkach takich jak: niska lub średnia zawartość wapnia w glebie, wysoka temperatura, zalanie systemu korzeniowego.	

CEBULA – produkcja dymki

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści – do początku formowania się główki cebuli	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◇ wzrost główki cebuli – do początku załamywania się szczypioru	

CZOSNEK uprawa w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◇/◆ początek formowania się główki czosnku Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadkach takich jak: niska lub średnia zawartość wapnia w glebie, wysoka temperatura, zalanie systemu korzeniowego.	
◇/◆ główka czosnku osiąga 30–50% typowej wielkości Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadkach takich jak: niska lub średnia zawartość wapnia w glebie, wysoka temperatura, zalanie systemu korzeniowego.	

POR – uprawa z rozsady, w polu – bez fertygacji

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇/◆ początkowy wzrost roślin Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadkach takich jak: niska lub średnia zawartość wapnia w glebie, wysoka temperatura, zalanie systemu korzeniowego.	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◇/◆ część przeznaczona do zbioru osiąga 30–50% typowej wielkości Termin zabiegu traktować jako optymalny w przypadkach takich jak: niska lub średnia zawartość wapnia w glebie, wysoka temperatura, zalanie systemu korzeniowego.	

WARZYWA CEBULOWE - produkcja rozsady

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ wzrost liści	Podlewanie – roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie – roztwór 0,25–0,3%

BROKUŁ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost liści	
◆ początek rozwoju róży	
◆ róża osiąga ok. 50% typowej wielkości	

KALAFIOR

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost liści	
◆ początek rozwoju róży	
◆ róża osiąga ok. 50% typowej wielkości	

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki	
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości	

KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki	
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości	

KALAREPA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost liści	

KAPUSTA PEKIŃSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki	
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości: 2 zabiegi co 7–14 dni	

KAPUSTA WŁOSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost liści	
◆ początek formowania się główki	
◆ główka osiąga ok. 50% typowej wielkości	
◆ główka osiąga 70–80% typowej wielkości	

KAPUSTA BRUKSELSKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost pędu głównego i liści	
◆ początek formowania się pąków bocznych (główek liściowych)	
◆ ok. 50% główek uformowanych	

RZODKIEWKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po wschodach roślin – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha

JARMUŻ

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◇ po przyjęciu się rozsady – rozwój liści	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ wzrost pędu głównego i liści	
◆ utworzone ok. 50% masy liściowej	

WARZYWA KAPUSTNE – produkcja rozsady

Terminy stosowania (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ wzrost liści	Podlewanie roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie roztwór 0,25–0,3%

MARCHEW

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 4. liścia właściwego – faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42)	
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)	
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47)	

PIETRUSZKA

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 4. liścia właściwego – faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42)	
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)	
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47)	

PASTERNAK

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 4. liścia właściwego – faza 5. liścia / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 14–15/41)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42)	
◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44)	
◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47)	

SELER

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
Rozsada ◆ rozwinięty 1. liść właściwy – faza 3. liścia (BBCH 11–13)	Podlewanie roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie roztwór 0,25–0,3%
Uprawa w gruncie ◆ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 17–19/41) ◆ korzeń osiąga ok.20% typowej średnicy (BBCH 42) ◆ korzeń osiąga 30–40% typowej średnicy (BBCH 43–44) ◆ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha

BURAK ĆWIKŁOWY

Terminy zabiegów dolistnych (◆ optymalne, ◇ opcjonalne):	Sposób aplikacji:
◆ faza 5 liści właściwych / początek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 15/31)	Zabiegi dolistne – jednorazowa dawka 4–6 L/ha
◆ początkowy rozwój korzenia spichrzowego, ø ›2 cm (BBCH 41–43)	
◆ korzeń osiąga 40–70% typowej średnicy (BBCH 44–47)	