CYNK MO

DROPLON

WIELOSKŁADNIKOWY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY

zapobiega niedoborom cynku

wspiera efektywne wykorzystanie azotu

dla roślin o dużym zapotrzebowaniu na cynk

TECHNOLOGY GCAA

Zn	Mo	N
24,0%	**0,30%**	**5,4%**
rozpuszczalnego w wodzie, w postaci glicynianu	rozpuszczalnego w wodzie, w postaci soli amonowej	azotu całkowitego

Przeznaczenie: DROPLON Cynk Mo zawiera cynk w postaci glicynianu, dzięki czemu Zn jest znacznie szybciej wchłaniany, przemieszczany i przyswajany przez rośliny niż z innych nawozów dolistnych. Dodatkowo zawiera molibden, który jest niezbędny dla efektywnego wykorzystania azotu pobranego przez rośliny. Nawóz przeznaczony jest do dokarmiania dolistnego. Niezbędny dla roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do Zn. Skutecznie zapobiega występowaniu i likwiduje objawy niedoboru Zn w roślinach. Polecany szczególnie dla roślin osłabionych, wymagających regeneracji. Stosować także w przypadku warunków glebowych ograniczających dostępność Zn dla roślin.

Zawartość składników pokarmowych:

cynk (Zn) 24,0%	rozpuszczalny w wodzie, w postaci glicynianu	**molibden (Mo)** 0,30%	rozpuszczalny w wodzie, w postaci soli amonowej

Produkt zawiera: 5,4% azotu całkowitego (N)

Instrukcje dotyczące stosowania: DROPLON Cynk Mo stosować nalistnie w postaci roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami po sprawdzeniu możliwości mieszania. Terminy stosowania, stężenie roztworu i ilość cieczy użytkowej dostosować do wymagań poszczególnych gatunków roślin, fazy rozwojowej, kondycji roślin, warunków uprawowych oraz techniki oprysku. W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie kropel. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki. Produkt przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych.

Przygotowanie cieczy roboczej: Do zbiornika wlać ½–⅔ potrzebnej ilości wody, dodać DROPLON Cynk Mo przy włączonym mieszadle. Podobnie wprowadzać inne dopuszczone i zalecane składniki roztworu, zgodnie z ich instrukcjami stosowania. Zbiornik uzupełnić wodą. Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.



UWAGA

UFI: R1P0-X0U3-100U-V20H

Zgodnie z WE 1272/2008. Zawiera: glicynian cynku
Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Unikać wdychania pyłu, dymu. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. Zawartość i pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.

Składniki: Glicynian cynku (CAS: 7214-08-6).
Gdzie: [1]Pierwotne surowce i mieszaniny.

Jednorazowa dawka

uprawy rolnicze:	0,2–0,6 kg/ha
drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy, krzewy owocowe, cytrusy i gatunki tropikalne, winorośl, truskawka	0,3–0,6 kg/ha
warzywa, rośliny ozdobne:	0,1–0,6 kg/ha

Terminy stosowania dla wybranych gatunków

Pszenica i inne zboża	**optymalnie:** Wiosna (zboża ozime): po ruszeniu wegetacji; (zboża jare): rozwój liści – krzewienie, **opcjonalnie:** Jesień (zboża ozime): faza 3.–6. liścia, wzrost źdźbła – do początku kłoszenia.
Rzepak	**optymalnie:** rozwój rozety liściowej,wzrost pędu głównego, **opcjonalnie:** formowanie pąków kwiatowych – do początku kwitnienia.
Kukurydza	**optymalnie:** faza 2–6. liścia, faza 7.–8. liścia, wzrost źdźbła – do początku rozwoju wiechy.
Ziemniak	**optymalnie:** początek wzrostu pędów i liści, początek zawiązywania bulw, początek wzrostu bulw, **opcjonalnie:** bulwy osiągają ok. 50% finalnej masy.
Drzewa ziarnkowe	**optymalnie:** pękanie pąków, faza „mysie ucho", koniec kwitnienia, po zbiorze owoców, przed początkiem przebarwiania się liści. **opcjonalnie:** różowy/biały pąk,
Drzewa pestkowe	**optymalnie:** nabrzmiewanie / pękanie pąków, rozwój pąków kwiatowych, • rozwój zawiązków owoców, • owoc osiąga ok. 30% typowej wielkości, • przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi, co 10–14 dni.
Krzewy owocowe	**optymalnie:** wznowienie wegetacji - pękanie pąków, • rozwój liści i pędów, • początek rozwoju kwiatostanów, • przed początkiem przebarwiania się liści: 1–2 zabiegi co 10–14 dni.
Truskawka	**optymalnie:** początek rozwoju liści i koron, początek rozwoju kwiatostanów, po zbiorach owoców.
Warzywa cebulowe	**optymalnie:** wzrost liści, **opcjonalnie:** początek formowania się części przeznaczonej do zbioru.
Warzywa korzeniowe	**optymalnie:** początek rozwoju korzenia spichrzowego, rozwój korzenia spichrzowego. **opcjonalnie:** rozwój liści,

Zalecane warunki przechowywania: Produkt higroskopijny – przechowywać w szczelnym, oznakowanym opakowaniu w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temp. od -10 do +30°C. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i warunków atmosferycznych. W przypadku rozsypania nawóz zebrać, a powierzchnię spłukać wodą. Zebrany produkt wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem lub przekazać do utylizacji.



Dystrybutor:
AGROAS sp. z o.o.
Nowa Wieś Mała 27B
49-200 Grodków
tel. +48 77 41 55 700
tel. +48 77 41 55 770
www.agroas.pl

Producent:
INTERMAG sp. z o.o.
al. 1000-lecia 15G
32-300 Olkusz
tel. +48 32 64 55 900
intermag@intermag.pl

Data ważności, nr partii, masa netto: na opakowaniu

CE