MIEDŹ MO

DROPLON

WIELOSKŁADNIKOWY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY

zapobiega niedoborom miedzi

wspiera efektywne wykorzystanie azotu

dla roślin o dużym zapotrzebowaniu na miedź

TECHNOLOGY GCAA

Cu	Mo	N
24,0%	**0,30%**	**5,0%**
rozpuszczalna w wodzie, w postaci glicynianu	rozpuszczalny w wodzie, w postaci soli amonowej	azotu całkowitego

Przeznaczenie: DROPLON Miedź Mo zawiera miedź w postaci glicynianu, dzięki czemu Cu jest znacznie szybciej wchłaniana, przemieszczana i przyswajana przez rośliny niż z innych nawozów dolistnych. Dodatkowo zawiera molibden, który jest niezbędny dla efektywnego wykorzystania azotu pobranego przez rośliny. Nawóz przeznaczony jest do dokarmiania dolistnego. Niezbędny dla roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do Cu. Skutecznie zapobiega występowaniu i likwiduje objawy niedoboru Cu w roślinach. Polecany szczególnie dla roślin osłabionych, wymagających regeneracji. Stosować także w przypadku warunków glebowych ograniczających dostępność Cu dla roślin.

Jednorazowa dawka	uprawy rolnicze, drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy, krzewy owocowe, cytrusy i gatunki tropikalne, winorośl, truskawka	warzywa, rośliny ozdobne
	0,1–0,6 kg/ha	0,1–0,3 kg/ha

Terminy stosowania dla wybranych gatunków

Pszenica i inne zboża	**optymalnie:** Wiosna (zboża ozime): po ruszeniu wegetacji; (zboża jare): rozwój liści – krzewienie, **opcjonalnie:** Jesień (zboża ozime): faza 3.–6. liścia, wzrost źdźbła – do początku kłoszenia.
Kukurydza	**optymalnie:** faza 7.–8. liścia, **opcjonalnie:** wzrost źdźbła – do początku rozwoju wiechy.
Ziemniak	**optymalnie:** wysokość roślin ok. 10 cm, **opcjonalnie:** wysokość roślin 15 cm.
Drzewa ziarnkowe	**optymalnie:** faza „mysie ucho", **opcjonalnie:** zielony pąk.
Drzewa pestkowe	**optymalnie:** rozwój pąków kwiatowych, **opcjonalnie:** po zbiorze.
Krzewy owocowe	**optymalnie:** wznowienie wegetacji, **opcjonalnie:** rozwój liści i pędów.
Truskawka	**optymalnie:** początek rozwoju kwiatostanów, **opcjonalnie:** początek rozwoju liści, po zbiorach owoców, 1–2 zabiegi co 10–14 dni
Warzywa psiankowate	**optymalnie:** intensywny wzrost roślin – początek kwitnienia, **opcjonalnie:** początek rozwoju owoców.
Warzywa dyniowate	**optymalnie:** rozwój liści i pędów bocznych – do początku kwitnienia: 1–3 zabiegi co 7–14 dni.
Warzywa cebulowe	**optymalnie:** cebula, czosnek: główka osiąga 60–80% typowej wielkości. **opcjonalnie:** wzrost liści,
Warzywa korzeniowe	**optymalnie:** początek rozwoju liści, początek rozwoju korzenia spichrzowego, **opcjonalnie:** korzeń osiąga 40–50% typowej wielkości.
Szkółki roślin ozdobnych	**optymalnie:** w okresie produkcji sadzonek: 2–3 zabiegi co 7–21 dni.

Zawartość składników pokarmowych:

miedź (Cu) 24,0%	rozpuszczalna w wodzie, w postaci glicynianu	**molibden (Mo)** 0,30%	rozpuszczalny w wodzie, w postaci soli amonowej

Produkt zawiera: 5,0% azotu całkowitego (N)

NIEBEZPIECZEŃSTWO

UFI: FVN0-X0F9-E00U-JCUD

Zgodnie z WE 1272/2008. Zawiera: glicynian miedzi.
Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Nie wdychać pyłu, dymu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość i pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.

Składniki:
Glicynian miedzi
(CAS: 32817-15-5).
Gdzie: [1]Pierwotne surowce i mieszaniny.

Zalecane warunki przechowywania:
Produkt higroskopijny – przechowywać w szczelnym, oznakowanym opakowaniu w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temp. od -10 do +30°C. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i warunków atmosferycznych. W przypadku rozsypania nawóz zebrać, a powierzchnię spłukać wodą. Zebrany produkt wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem lub przekazać do utylizacji.





Instrukcje dotyczące stosowania: DROPLON Miedź Mo stosować nalistnie w postaci roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami po sprawdzeniu możliwości mieszania. Terminy stosowania, stężenie roztworu i ilość cieczy użytkowej dostosować do wymagań poszczególnych gatunków roślin, fazy rozwojowej, kondycji roślin, warunków uprawowych oraz techniki oprysku. W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie kropel. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki. Produkt przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych.

Przygotowanie cieczy roboczej: Do zbiornika wlać ½–⅔ potrzebnej ilości wody, dodać DROPLON Miedź Mo przy włączonym mieszadle. Podobnie wprowadzać inne dopuszczone i zalecane składniki roztworu, zgodnie z ich instrukcjami stosowania. Zbiornik uzupełnić wodą. Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

UN 3260

CE

Dystrybutor:
AGROAS sp. z o.o.
Nowa Wieś Mała 27B
49-200 Grodków
tel. +48 77 41 55 700
tel. +48 77 41 55 770
www.agroas.pl

Producent:
INTERMAG sp. z o.o.
al. 1000-lecia 15G
32-300 Olkusz
tel. +48 32 64 55 900
intermag@intermag.pl

Data ważności, nr partii, masa netto: na opakowaniu