MANGAN MO

DROPLON

WIELOSKŁADNIKOWY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY

zapobiega niedoborom manganu

wspiera efektywne wykorzystanie azotu

dla roślin o dużym zapotrzebowaniu na mangan

TECHNOLOGY GCAA

Mn	Mo	N
22,0%	**0,30%**	**5,4%**
rozpuszczalnego w wodzie, w postaci glicynianu	rozpuszczalnego w wodzie, w postaci soli amonowej	azotu całkowitego

Przeznaczenie: DROPLON Mangan Mo zawiera mangan w postaci glicynianu, dzięki czemu Mn jest znacznie szybciej wchłaniany, przemieszczany i przyswajany przez rośliny niż z innych nawozów dolistnych. Dodatkowo zawiera molibden, który jest niezbędny dla efektywnego wykorzystania azotu pobranego przez rośliny. Nawóz przeznaczony jest do dokarmiania dolistnego. Niezbędny dla roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do Mn. Skutecznie zapobiega występowaniu i likwiduje objawy niedoboru Mn w roślinach. Polecany szczególnie dla roślin osłabionych, wymagających regeneracji. Stosować także w przypadku warunków glebowych ograniczających dostępność Mn dla roślin.

Zawartość składników pokarmowych:

mangan (Mn) 22,0%	rozpuszczalny w wodzie, w postaci glicynianu	**molibden (Mo)** 0,30%	rozpuszczalny w wodzie, w postaci soli amonowej

Produkt zawiera: 5,4% azotu całkowitego (N)

Instrukcje dotyczące stosowania: DROPLON Mangan Mo stosować nalistnie w postaci roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami po sprawdzeniu możliwości mieszania. Terminy stosowania, stężenie roztworu i ilość cieczy użytkowej dostosować do wymagań poszczególnych gatunków roślin, fazy rozwojowej, kondycji roślin, warunków uprawowych oraz techniki oprysku. W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie kropel. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki. Produkt przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych.

Przygotowanie cieczy roboczej: Do zbiornika wlać ½–⅔ potrzebnej ilości wody, dodać DROPLON Mangan Mo przy włączonym mieszadle. Podobnie wprowadzać inne dopuszczone i zalecane składniki roztworu, zgodnie z ich instrukcjami stosowania. Zbiornik uzupełnić wodą. Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska: W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem i poka- zać mu etykietę. Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Nie wdychać pyłów. Stosować maski przeciwpyłowe, okulary, rękawice i odzież ochronną. Przestrzegać zasad higieny. W przypadku: wdychania pyłu – wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku: spożycia – przepłukać usta i podać wodę do picia, tylko gdy poszkodowany jest przytomny. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku: zanie- czyszczenia oczu i skóry – spłukać dużą ilością wody, a ubranie wyprać przed ponownym użyciem.

Składniki: Glicynian manganu[1] (WE: 945-591-4).
Gdzie: [1]Pierwotne surowce i mieszaniny.

Jednorazowa dawka

uprawy rolnicze, drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy, winorośl	0,2-0,6 kg/ha
krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne	0,1–0,6 kg/ha

Terminy stosowania dla wybranych gatunków

Pszenica i inne zboża	**optymalnie:** Jesień (zboża ozime): faza 3.–6. liścia, Wiosna (zboża ozime): po ruszeniu wegetacji; (zboża jare): rozwój liści – krzewienie, wzrost źdźbła – do początku kłoszenia
Rzepak	**optymalnie:** rozwój rozety liściowej, wzrost pędu głównego, **opcjonalnie:** formowanie pąków kwiatowych – do początku kwitnienia.
Kukurydza	**optymalnie:** faza 7.–8. liścia, **opcjonalnie:** wzrost źdźbła – do początku rozwoju wiechy
Ziemniak	**optymalnie:** wysokość roślin ok. 10 cm, wysokość roślin >15 cm, **opcjonalnie:** bulwy osiągają ok. 50% finalnej masy
Drzewa ziarnkowe	**optymalnie:** owoc osiąga 60–80% typowej wielkości. **opcjonalnie:** faza „mysie ucho", owoc osiąga 30–50% typowej wielkości
Drzewa pestkowe	**optymalnie:** wzrost owoców: 1–2 zabiegi co 14–21 dni. **opcjonalnie:** rozwój pąków kwiatowych, rozwój zawiązków owoców
Truskawka	**optymalnie:** początek rozwoju liści i koron, po zbiorach owoców. **opcjonalnie:** początek rozwoju kwiatostanów
Warzywa psiankowate	**optymalnie:** intensywny wzrost roślin, początek rozwoju owoców **opcjonalnie:** początek rozwoju pąków kwiatowych
Warzywa dyniowate	**optymalnie:** rozwinięty 3.–6. liść, intensywny wzrost roślin, **opcjonalnie:** po kolejnych zbiorach / wzrost owoców: 1–2 zabiegi co 7–21 dni.
Warzywa cebulowe	**optymalnie:** wzrost liści, **opcjonalnie:** początek formowania się części przeznaczonej do zbioru
Warzywa kapustne	**optymalnie:** wzrost liści, wzrost części przeznaczonych do zbioru 1–2 zabiegi co 7–21 dni
Warzywa korzeniowe	**optymalnie:** rozwój liści, **opcjonalnie:** początek rozwoju korzenia spichrzowego

Zalecane warunki przechowywania: Produkt higroskopijny – przechowywać w szczelnym, oznakowanym opakowaniu w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temp. od -10 do +30°C. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i warunków atmosferycznych. W przypadku rozsypania nawóz zebrać, a powierzchnię spłukać wodą. Zebrany produkt wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem lub przekazać do utylizacji.



Dystrybutor:
AGROAS sp. z o.o.
Nowa Wieś Mała 27B
49-200 Grodków
tel. +48 77 41 55 700
tel. +48 77 41 55 770
www.agroas.pl

Producent:
INTERMAG sp. z o.o.
al. 1000-lecia 15G
32-300 Olkusz
tel. +48 32 64 55 900
intermag@intermag.pl

Data ważności, nr partii, masa netto: na opakowaniu

CE