ŻELAZO MO

DROPLON

WIELOSKŁADNIKOWY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY

- zapobiega niedoborom żelaza
- wspiera efektywne wykorzystanie azotu
- przyśpieszone wchłanianie żelaza

TECHNOLOGY GCAA

Fe	Mo	N
20,0%	**0,30%**	**4,4%**
rozpuszczalnego w wodzie, w postaci glicynianu	rozpuszczalnego w wodzie, w postaci soli amonowej	azotu całkowitego

Przeznaczenie: DROPLON Żelazo Mo zawiera żelazo w postaci glicynianu, dzięki czemu Fe jest znacznie szybciej wchłaniane, przemieszczane i przyswajane przez rośliny niż z innych nawozów dolistnych. Dodatkowo zawiera molibden, który jest niezbędny dla efektywnego wykorzystania azotu pobranego przez rośliny. Nawóz przeznaczony jest do dokarmiania dolistnego. Niezbędny dla roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do Fe. Skutecznie zapobiega występowaniu i likwiduje objawy niedoboru Fe w roślinach. Polecany szczególnie dla roślin osłabionych, wymagających regeneracji. Stosować także w przypadku warunków glebowych ograniczających dostępność Fe dla roślin.

Zawartość składników pokarmowych:

żelazo (Fe) 20,0%	rozpuszczalne w wodzie, w postaci glicynianu	**molibden (Mo)** 0,30%	rozpuszczalny w wodzie, w postaci soli amonowej

Produkt zawiera: 4,4% azotu całkowitego (N)

Instrukcje dotyczące stosowania: DROPLON Żelazo Mo stosować nalistnie w postaci roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami po sprawdzeniu możliwości mieszania. Terminy stosowania, stężenie roztworu i ilość cieczy użytkowej dostosować do wymagań poszczególnych gatunków roślin, fazy rozwojowej, kondycji roślin, warunków uprawowych oraz techniki oprysku. W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie kropel. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki. Produkt przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych.

Przygotowanie cieczy roboczej: Do zbiornika wlać ½–⅔ potrzebnej ilości wody, dodać DROPLON Żelazo Mo przy włączonym mieszadle. Podobnie wprowadzać inne dopuszczone i zalecane składniki roztworu, zgodnie z ich instrukcjami stosowania. Zbiornik uzupełnić wodą. Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska: W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem i pokazać mu etykietę. Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Nie wdychać pyłów. Stosować maski przeciwpyłowe, okulary, rękawice i odzież ochronną. Przestrzegać zasad higieny. W przypadku: wdychania pyłu – wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku spożycia – przepłukać usta i podać wodę do picia, tylko gdy poszkodowany jest przytomny. Nie wywoły- wać wymiotów. W przypadku: zanieczyszczenia oczu i skóry – spłukać dużą ilością wody, a ubranie wyprać przed ponownym użyciem.

Składniki: Glicynian żelaza[1] (CAS: 20150-34-9).
Gdzie: [1]Pierwotne surowce i mieszaniny.

Jednorazowa dawka

uprawy rolnicze, drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy, winorośl	0,3–0,7 kg/ha
krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne	0,1–0,7 kg/ha

Terminy stosowania dla wybranych gatunków

Rzepak	**optymalnie:** rozwój rozety liściowej, wzrostu pędu głównego i bocznych, koniec kwitnienia – do początku rozwoju łuszczyn.
Kukurydza	**optymalnie:** faza 2–6. liścia, wzrost źdźbła – do początku rozwoju wiechy
Ziemniak	**optymalnie:** wysokość roślin ok. 10 cm, wysokość roślin 15 cm **opcjonalnie:** początek wzrostu bulw, bulwy osiągają ok. 50% finalnej masy
Burak cukrowy	**optymalnie:** początek rozwoju liści, początek zakrywania międzyrzędzi, **opcjonalnie:** początek rozwoju korzenia spichrzowego.
Soja i inne strączkowe	**optymalnie:** rozwój pierwszych liści właściwych, początek rozwoju pąków kwiatowych, początek rozwoju strąków i nasion.
Drzewa ziarnkowe	**optymalnie:** faza „mysie ucho", **opcjonalnie:** koniec kwitnienia, owoc osiąga 30–50% typowej wielkości.
Drzewa pestkowe	**optymalnie:** rozwój pąków kwiatowych, rozwój zawiązków owoców, owoc osiąga ok. 30–50% typowej wielkości.
Krzewy owocowe	**optymalnie:** wznowienie wegetacji, rozwój owoców **opcjonalnie:** rozwój liści i pędów, początek rozwoju kwiatostanów.
Truskawka – plantacje owocujące	**optymalnie:** początek rozwoju liści i koron, początek rozwoju kwiatostanów, **opcjonalnie:** po zbiorach owoców: 1–2 zabiegi co 10–14 dni.
Warzywa psiankowate	**optymalnie:** po przyjęciu się rozsady, **opcjonalnie:** początek rozwoju pąków kwiatowych, początek rozwoju owoców: 1–2 zabiegi co 7–21 dni, po kolejnych zbiorach.
Warzywa dyniowate	**optymalnie:** rozwinięty 3.–6. liść, intensywny wzrost roślin: 1–2 zabiegi co 7–14 dni, po kolejnych zbiorach / wzrost owoców: 1–5 zabiegów co 7–21 dni.
Warzywa kapustne	**optymalnie:** rozwój liści: 1–2 zabiegi co 7–14 dni, **opcjonalnie:** wzrost części przeznaczonych do zbioru: 1–2 zabiegi co 7–21 dni.
Warzywa korzeniowe	**optymalnie:** początek rozwoju liści, początek rozwoju korzenia spichrzowego, **opcjonalnie:** korzeń osiąga 40–50% typowej wielkości.

Zalecane warunki przechowywania: Produkt higroskopijny – przechowywać w szczelnym, oznakowanym opakowaniu w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temp. od -10 do +30°C. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i warunków atmosferycznych. W przypadku rozsypania nawóz zebrać, a powierzchnię spłukać wodą. Zebrany produkt wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem lub przekazać do utylizacji.



Dystrybutor:
AGROAS sp. z o.o.
Nowa Wieś Mała 27B
49-200 Grodków
tel. +48 77 41 55 700
tel. +48 77 41 55 770
www.agroas.pl

Producent:
INTERMAG sp. z o.o.
al. 1000-lecia 15G
32-300 Olkusz
tel. +48 32 64 55 900
intermag@intermag.pl

Data ważności, nr partii, masa netto: na opakowaniu

CE