Gwarantowana zawartość:

Całkowita zawartość azotu (N):		66 g/l	5,5% w/w
Azot (N)	amidowy	48 g/l	4,0% w/w
Azot (N)	organiczny	18 g/l	1,5% w/w
Fosfor (P_2O_5)	rozpuszczalny w wodzie	60 g/l	5,0% w/w
Potas (K_2O)	rozpuszczalny w wodzie	42 g/l	3,5% w/w
Żelazo (Fe)	rozpuszczalne w wodzie schelatowane przez EDDHA	0,48 g/l	0,04% w/w
Mangan (Mn)	rozpuszczalny w wodzie schelatowany przez EDTA	0,60 g/l	0,05% w/w
Molibden (Mo)	rozpuszczalny w wodzie	1,20 g/l	0,10% w/w
Cynk (Zn)	rozpuszczalny w wodzie schelatowany przez EDTA	0,80 g/l	0,07% w/w

Zakres pH stabilności frakcji schelatowanej: 3-11 (Fe) i 4-9 (Mn, Zn)

KOMPATYBILNOŚĆ

Biobrot jest kompatybilny z większością nawozów i agrochemikalii powszechnie używanych. Zaleca się przeprowadzić test przed przygotowaniem mieszaniny. Nie mieszać z produktami opartymi na miedzi w aplikacjach dolistnych. Aplikować na suche liście, aby uzyskać lepszą efektywność. W celu uzyskania optymalnej penetracji wykonywać zabiegi minimum na 3-4 godziny przed prognozowanym deszczem. W razie wątpliwości skonsultować się z autoryzowanym przedstawicielem.

Zalecane warunki przechowywania: Chronić przed dziećmi. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami

Dystrybutor:
AGROAS sp. z o.o.
Nowa Wieś Mała 27B
49-200 Grodków tel. +48 77 41 55 700
tel. +48 77 41 55 770
www.agroas.pl

Producent:
TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U.
Parque Empresarial Cristalia,
Edificio Onic 5, 6ta planta.
Vía de los Poblados, 3. 28033 Madrid (Spain).
Tel: +34 913 273 200 www.tradecorp.com.es

Lepiej wykonać kilka aplikacji dawką minimalną niż 1 zabieg dużą dakwą. Duże dawki stosujemy w przypadku wystąpienia silnego stresu abiotycznego. Używać minimum 150-200 litrów wody/ha. Maksymalna dawka to 5 l/ha/aplikację. Nie stosować podczas kwitnienia.

Aplikacja doglebowa:

Linie nawadniające:	5-10 l/ha/aplikację w 2-4 dawkach każdego tygodnia we wczesnych fazach, zaczynamy zaraz po wysadzeniu roślin.

Aplikacja dolistna:

Ziemniaki:	2-4 l/ha/ aplikację zachowując odstęp 15 dni pomiędzy zabiegami od fazy 15-cm do pełnego zakrycia międzyrzędzi.2-3 l/ha/ aplikację podczas wzrostu bulw.
Buraki cukrowe:	2-4 l/ha/ aplikację przed pełnym zakryciem międzyrzędzi.
Zboża:	1-2l/ha aplikacja jesienią 3-6 liści, wiosną po ruszeniu wegetacji, wzrost źdźbła do początku kłoszenia
Rzepak:	1,5-2,5 l/ha pierwsza aplikacja w czasie tworzenia rozety 4-8 liści, wiosną po ruszeniu wegetacji oraz przed i po kwitnieniu do zakończenia tworzenia łuszczyn w połączeniu z zabiegami fungicydowymi.
Kukurydza:	3-5 l/ha w fazie 4-6 liści.
Groch, łubin, fasola:	2 x 1,5-3 l/ha jak tylko ulistnienie będzie wystarczająco rozwinięte, zakończyć przed fazą kwitnienia.
Warzywa polowe:	2-4 x 2 l/ha jak tylko ulistnienie będzie wystarczająco rozwinięte.
Pozostałe uprawy:	1,5-3 l/ha/aplikację jak tylko ulistnienie będzie wystarczająco rozwinięte.



Data ważności, nr partii, masa netto: na opakowaniu

BIOBROT

DROPLON

NAWÓZ NPK Z AMINOKWASAMI I CHELATOWANYMI MIKROELEMENTAMI

WPROWADZONY NA TERYTORIUM POLSKI NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 10 LIPCA 2007 R. O NAWOZACH I NAWOŻENIU ART. 5 DEKRET KRÓLEWSKI HISZPANII 506/2013 W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW

N	P_2O_5	K_2O	Fe	Mn
5,5%	**5,0%**	**3,5%**	**0,04%**	**0,05%**
amidowy: 4,0% organiczny: 1,5%	rozpuszczalny w wodzie	rozpuszczalny w wodzie	rozpuszczalne w wodzie schelatowane przez EDDHA	rozpuszczalne w wodzie schelatowane przez EDDHA

Mo	Zn
0,10%	**0,07%**
rozpuszczalny w wodzie	rozpuszczalny w wodzie schelatowany przez EDTA

Aminogram:
kwas asparginowy, kwas glutaminowy (56%), Seryna, Histidyna,Glicyna, Treonina, Alanina, Arginina, Tyrozyna, Walina, Metionina,Fenyloalanina, Izoleucyne, Leucyna, Lizyna, Hydroxyprolina, Prolina.

Produkt nawozowy klasy C

Zawartość metali ciężkich poniżej dozwolonego limitu dopuszczonych dla tej klasy

POJEMNOŚĆ NETTO
1 l

MASA NETTO
1,2 kg